

حرکت

شماره ۱۸ - ص ص : ۱۱۵ - ۹۲

تاریخ دریافت : ۲۶/۰۴/۸۲

تاریخ تصویب : ۰۳/۰۸/۸۲

تأثیر تمرینات هوازی باشد های مختلف بر حذف mtDNA عضله نعلی موش های صحرایی

دکتر افسار جعفری^۱ - دکتر محمدعلی حسین پورفیضی - دکتر مسعود هوشمند -

دکتر علی اصغر رواسی - مریم منتظری

استادیار دانشگاه تبریز - استادیار دانشگاه تبریز - استادیار مرکز ملی تحقیقات زنتیک و

تکنولوژی زیستی - استادیار دانشگاه تهران - مریم مرکز ملی تحقیقات مهندسی زنتیک و

تکنولوژی زیستی

چکیده

با توجه به نظریه پیری میتوکندریایی و افزایش استرس اکسیداتیو حین فعالیت های هوازی، فرض شد که این نوع تمرینات ممکن است در بروز حذف mtDNA عضلات اسکلتی و پیری زودرس دخالت داشته باشد. بدین منظور ۶۰ سر موش صحرایی (wistar 14848) نر دوماهه در شش گروه ده تا یک جایگزین شدند. برای کنترل عوامل مداخله گر، دو گروه از آزمودنی ها در دو ماهگی (con1) و پنج ماهگی (con2) کشته شدند. دو گروه نیز در یک برنامه تمرینی سه ماهه (پنج روز در هفته دویden روی نوار گردان الکتریکی با شیب ۶ درصد) (E₂₀=20m/min, 40min, E₄₀=40m/min, 20min) شرکت داشتند. در انتهای دوره، دو گروه به عنوان آزمودنی های تمرین نکرده در پنج ماهگی، فقط برای یکبار روی نوار گردان دویden شدند (CE₂₀=20m/min, 40min, CE₄₀=40m/min, 20min, slob=6%). یافته های حاصله از روش های Multiplex PCR و توالی خوانی نشان می دهد تمرینات هوازی شدید می تواند سبب بروز حذف ۶/۴ کیلو بازی در mtDNA عضله نعلی شود.

واژه های کلیدی

تمرینات هوازی، استرس اکسیداتیو، پیری، ژنوم میتوکندریایی (mtDNA) و حذف های میتوکندریایی.

مقدمه

یکی از چالش‌هایی که از دیرباز ذهن بیشتر دانشمندان علوم بیولوژی مولکولی را به خود مشغول ساخته، پیری و بیماری‌های مربوط به آن است. اهمیت این مسئله در سطح جهانی به حدی است که سازمان یونسکو هزاره سوم را هزاره پیری معرفی کرده است.

افت شدید توانایی‌های فیزیولوژیکی، مکانیکی و افزایش بیماری‌های استحاله‌ای دوران سالخوردگی، از عمدۀ ترین مسایل مربوط به فرایند پیری بشمار می‌روند، زیرا چالش فوق، در بالا رفتن هزینه‌های نگهداری و درمان دستگاه‌های دولتی، خانواده‌ها و خود فرد دخالت اساسی دارند و موجب از کارافتادگی و منزوی شدن فرد سالخوردۀ می‌شوند.

تفییرات ایجاد شده در هوموستاز موجودات مسن، احتمالاً در نتیجه برنامه‌های ژنتیکی و تحت تأثیر پاسخ عوامل برونزاد رخ خواهد داد. با این حال، براساس نظریه‌های رویدادهای اتفاقی، پیری در نتیجه آسیب‌های اتفاقی در مولکول‌های حیاتی رخ می‌دهد. در واقع، تجمع آسیب‌های ناشی از بالا رفتن سن می‌تواند در افت عملکردهای فیزیولوژیکی و فرایند پیری دخالت اساسی داشته باشد (۱، ۲، ۳، ۶، ۱۵ و ۲۲).

نظریه پیری بنیان‌های آزاد هارمان^۱ به این نکته اشاره دارد که تولید درونزاد گونه‌های فعال اکسیژن (ROS)^۲ در موجودات هوایی با برهم زدن تعادل اکسیدانی / آنتی اکسیدانی سبب بروز تغییرات عمدۀ در بیشتر مولکول‌های زیستی از جمله DNA هسته‌ای و میتوکندریایی می‌شود (۲۵ و ۳۶).


ژنوم میتوکندری، یک DNA فوق کروموزومی و حلقوی است. در هر سلول هسته‌دار انسانی، هزاران نسخه DNA میتوکندریایی (۳ الی ۱۰ مولکول در هر میتوکندری) وجود دارد. سهم این مولکول از کل DNA سلولی، در حدود نیم درصد است. ژنوم میتوکندری یا mtDNA انسانی، یک مولکول حلقوی دو رشته‌ای با ۱۶۵۶۹ جفت باز آلی (bp)^۳ است. رشته‌های

1- Harman

2- Reactive Oxygen Species

3- Base pair

حلقوی این ژنوم از لحاظ ترکیب بازهای آلی متفاوتند. رشته خارجی و سنگین^۱ غنی از بازهای آلی پورین، یعنی آدنین و گوانین ($A+G$)، در حالی که رشته داخلی و سبک^۲ بیشتر محتوی بازهای آلی پرمیدین، یعنی سیتوزین و تیمین ($C+T$) است. ژنهای کدکنندهٔ پلی‌پپتیدهای میتوکندریایی، از جمله ۱۳ زیرگروه زنجیرهٔ تنفسی، دو ژن خاص *rRNAs*, ۱۲s, ۱۶s (*rRNAs*) و ۲۲ ژن *tRNAs* ضروری برای سنتز پروتئین‌های میتوکندریایی، ۹۳٪ ساختار *mtDNA* را به خود اختصاص داده‌اند (شکل ۱) (۱۶).




شکل ۱- نقشه ژنوم میتوکندریایی

در اثر واکنش اکسیژن با بیومولکول‌های جانداران هوایی، بینان‌هایی مانند سوپراکسید، پراکسید هیدروژن و هیدروکسیل ساخته می‌شود (۹). حدود ۵-۲۰ درصد اکسیژن مصرفی طی فرایندهای زنجیرهٔ تنفسی به صورت فعال به بینان‌های آزاد سوپراکسید تبدیل می‌شود. بینان سوپراکسید تقریباً در تمام سلول‌های هوایی ساخته می‌شود. عمدترين منبع توليد اين بینان،

در زنجیره تنفسی و شبکه آندوپلاسمی قرار دارد (۸). طی واکنش دسموتاز سوپراکسید، مولکول‌های اکسیژن و بنیان پراکسید هیدروژن آزاد می‌شود (۱۰ و ۱۱). مولکول پراکسید هیدروژن خیلی فعال نیست، لیکن می‌تواند به گونه خیلی فعال (هیدروکسیل) تبدیل شود. اگر پراکسید هیدروژن با یون‌های آهن موجود در بدن جانداران واکنش دهد، محصول نهایی بنیان هیدروکسیل خواهد بود (۳۰). بنیان هیدروکسیل از قدرت خیلی زیادی برخوردار است (۲۸). همه عناصر فعال بویژه هیدروکسیل، می‌تواند آسیب‌های اکسیداتیو را به صورت پراکسیداسیون فسفولیپیدهای غشایی، بروز تغییرات اسید دزواکسی ریبونوکلئیک، یا تغییرات پروتئینی ناشی از تغییرات آنزیمی و پروتئولیزی، ایجاد کند (۱۲، ۲۹ و ۳۱). اما آسیب‌های وارد به بیومولکول‌ها از ویژگی خاصی برخوردارند. محل آسیب‌های مولکولی، به ویژگی ساختار پیوندهای بین یون‌های آهن یا مس و ماکرومولکول‌ها وابسته است (۲۱ و ۳۲). برای مثال تولید بیش از حد بنیان هیدروکسیل در کنار *DNA*، می‌تواند موجب تغییر بازهای آلی و شکسته شدن رشته‌های *DNA* شود (۱۹). مولکول *DNA* تحت تأثیر گونه‌های فعال اکسیژن، اکسید می‌شود، از این‌رو می‌توان با استفاده از نسبت ۸-هیدروکسی ۲-دی اکسی گوانوزین به ۲ دی اکسی گوانوزین (8-*ohdg/dg*)، میزان *DNA* اکسیدشده را برآورد کرد.

با مطالعه *mtDNA* بافت‌های مختلف موش‌های صحرایی و خانگی، مشخص شد میزان *oxo8dG* با بالا رفتن سن افزایش می‌یابد (۱۳). گروه تحقیقاتی آمرز^۱، میزان *oxo8dG* ژنوم میتوکندریالی (*mtDNA*) کبد موش‌های صحرایی نر پیر را در حدود ۲-۳ نشان داد میزان *oxo8dG* در گزارش کرده‌اند (۱)، در حالی که مشاهدات گروه همیلتون^۲ نشان داد میزان *oxo8dG* در بافت کبدی موش‌های صحرایی تقریباً ۵۰ تا ۱۲۴ درصد بیشتر از همتیان جوان است (۱۳). بررسی وضعیت استرس اکسیداتیو با استفاده از میزان *oxo8dG* میتوکندریالی، فقط یک روش تخمینی است. از این‌رو برای تشخیص و تعیین دقیق میزان آسیب‌ها و جهش‌های *mtDNA* باید از روش‌های مولکولی معتبر *PCR*^۳، *RFLP*^۴، *SSCP*^۵، توالی خوانی^۶، و

^۱SSCP، ^۲RFLP، ^۳توالی خوانی و ^۴لکه‌گذاری ساترن استفاده کرد. حذف معمولی ^۵mtDNA₄₉₇₇ از جمله جهش‌های شناخته شده‌ای است که با بالا رفتن سن در بیشتر بافت‌های پیکری انسان تجمع پیدا می‌کند. تجمع این جهش می‌تواند بر واکنش‌های فسفریلاسیون اکسیداتیو و افت میزان ATP تأثیر بسزایی بگذارد. از طرفی، کاهش مداوم تأمین انرژی بر عملکردهای سلول، آسیب وارد کرده و موجب افزایش بروز بیماری‌های مختلف و در نهایت بالا رفتن مرگ و میر می‌شود (شکل ۲) (۳۵، ۲۸، ۱۸، ۷). در برخی مطالعات، میزان جهش mtDNA را در حدود ۱۰ برابر nDNA گزارش کرده‌اند. دلیل عمدۀ این مطلب به میزان مصرف اکسیژن در میتوکندری (بیش از ۹۰ درصد اکسیژن سلولی)، ساز و کارهای ناکارامد ترمیمی mtDNA و مجاورت غشای میتوکندریابی با گونه‌های فعل اکسیژن بر می‌گردد (۴، ۱۰، ۲۳).



شکل ۲ - تعامل بین بنیان‌های آزاد و DNA میتوکندریابی

تولید بنیان‌های آزاد در عضلات اسکلتی، حین انجام فعالیت‌های بدنی، نسبت به هنگام

1- Random Fragment Length Polymorphism

2- Single Stranded Conformation Polymorphism

3- Sequencing

4- Southern blotting

۵- Common deletion - حذف بازی است که معمولاً با بالا رفتن سن در mtDNA اکثر بافت‌های انسان، بخصوص بافت‌های پیکری، دیده می‌شود.

6- Turn-over

استراحت بدلیل افزایش ۱۰۰ برابری مصرف اکسیژن، خیلی بیشتر است (۲۰). علاوه بر تنفس میتوکندریایی، واکنش‌های انتین اکسیداز، سوخت و ساز پروستاتنوزیدی و فعالیت اکسیدازی نیکوتین آمید آدنین دی نوکلوتید فسفات^۱، به عنوان منابع اصلی تولید بینان‌های آزاد در حین فعالیت‌های ورزشی می‌توانند عمل کنند. افزایش فرایندهای ریزه‌خواری گلبول‌های سفید پس از آسیب‌های عضلانی، به عنوان منبع فرعی در تولید بینان‌های آزاد دخالت خواهد داشت. با این حال، فعالیت‌های بدنی مشخص ممکن است بر میزان تولید بینان‌های آزاد، اثرهای متفاوتی بر جای بگذارند. فعالیت بینان‌های آزاد و بویژه گونه‌های فعال اکسیژن در عضلات اسکلتی، با توجه به عواملی چون شدت، مدت و نوع فعالیت بدنی یا نوع انقباض، متفاوت است. به عبارتی، نیازمندی‌های متفاوت انرژی، اکسیژن مصرفی و بارهای مکانیکی وارد به بافت‌های نرم درگیر در انواع فعالیت‌های بدنی بر میزان تولید بینان‌های آزاد تأثیر می‌گذارند. از این‌رو می‌توان نتیجه گرفت فعالیت‌های بدنی به عنوان یکی از منابع اصلی تولید بینان‌های آزاد، ممکن است در بروز استرس اکسیداتیو دخالت اساسی داشته باشد (۲۶). البته نباید فراموش کرد که تعامل بین سه مؤلفه استرس اکسیداتیو (اکسیدان‌ها، آتنی اکسیدان‌ها و فرایندهای ترمیمی) به صورت بازخورددهای مثبت و منفی، تعیین‌کننده اصلی میزان خدمات اکسیداتیو و در نهایت پیری و بیماری‌های مربوط به آن خواهد بود (۵، ۱۴ و ۳۳). با توجه به موضوع تحقیق و آنچه گفته شد، سؤالات قابل طرح عبارتند از: فعالیت‌های ورزشی هوازی چه تأثیری بر تجمع صدمات mtDNA از جمله حذف معمولی به عنوان یکی از شاخص‌های اصلی روند پیری دارد؟ آیا یک وله فعالیت ورزشی هوازی با شدت‌های مختلف می‌تواند سبب بروز جهش در mtDNA شود؟ در صورت وقوع جهش در mtDNA چه تفاوتی بین آثار فعالیت ورزشی هوازی شدید و متوسط وجود دارد؟ آیا تمرینات ورزشی منظم می‌تواند از بروز جهش در mtDNA جلوگیری کند؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، کدامیک از تمرینات هوازی می‌تواند در کاهش جهش mtDNA دخالت اساسی داشته باشد؟

تا هنگام شروع تحقیق حاضر، هیچ‌گونه گزارشی درباره آسیب‌های اکسیداتیو وارد به

نشده بود. ساکایی و همکارانش^۱ (۱۹۹۹) برای اولین بار دریافتند افزایش استرس اکسیداتیو ناشی از اجرای یک وهله فعالیت هوایی شدید، موجب جهش mtDNA عضلات اسکلتی موش‌های صحرایی می‌شود. این گروه تحقیقاتی برای تأیید فرضیه خود از دو گروه موش صحرایی (گروه آزمون = ۴، و گروه کنترل = ۵) استفاده کردند.

برنامه فعالیت بدنی برای گروه آزمون شامل دویدن به مدت ۲۰ دقیقه روی نوار گردان با شدت حدود ۴۰ متر در دقیقه بود. پس از بررسی یافته‌های بدست آمده از PCR، آن‌ها دریافتند یک وهله فعالیت بدنی می‌تواند سبب بروز حذف‌های بزرگ میتوکندریایی (۷۰-۲۵bp) در عضله نعلی شود، اما هیچ‌گونه گزارشی درباره بروز جهش در mtDNA عضله درشت نی قدامی ارایه ندادند. در نهایت، نتیجه گیری کردند که فعالیت‌های بدنی شدید می‌تواند در بروز حذف‌های بزرگ میتوکندریایی دخالت داشته باشد، اما در مورد آسیب‌های اکسیداتیو mtDNA باید ویژگی تارهای عضلانی را نیز در نظر گرفت (۲۷).

گروه تحقیقاتی ای وای^۲ (۲۰۰۳) نیز با بررسی mtDNA گلبول‌های سفید خون پنج زن جوان سالم (با میانگین سنی ۲۰ سال) دریافتند ۳۰ دقیقه دوچرخه‌سواری با شدت ۵۰-۶۰ وات و سرعت پدالزنی ۶۰ دور در دقیقه برای سه روز متوالی موجب بروز حذف معمولی (۴۹۷۷) در mtDNA گلبول‌های سفید آزمودنی‌های فوق می‌شود. حذف مشاهده شده پس از ۴-۲ روز ناپدید و ۶-۵ روز پس از آخرین وهله فعالیت مجدد آشکار شد. توجیه آنها برای ناپدید شدن حذف mtDNA در ۴-۲ روز پس از فعالیت بدنی، با توجه به ضعف سیستم ترمیمی میتوکندریایی به فعالیت آنزیم تخریب کننده^۳ مرتبط دانستند. اما برای ظهور مجدد حذف mtDNA هیچ‌گونه توجیهی ارائه ندادند. بنابراین نتیجه گرفتند که حذف در گلبول‌های سفید خون، روندی پویا^۴ است (۱۷). گروه تحقیقاتی هالر^۵ با

1- Sakai

2- Iwai

3- Decomposition Enzyme

4- Dynamic

5- Haller

دریافت پروژه تعریض ژن میتوکندریایی^۱، تلاش کردند تا با کمک تمرینات قدرتی، به روش تازه‌ای برای درمان بیماران میتوکندریایی دست پیدا کنند. این گروه تحقیقاتی با بررسی آثار تمرینات هوایی روی ۱۰ فرد مبتلا به بیماری‌های میتوکندریایی پس از ۱۴ هفته اعلام کردند سهم *mtDNA* جهش‌یافته در شش نفر از شرکت کنندگان تحت بررسی، افزایش پیدا کرد (۳۴). با این حال، توصیه گروه هالر به این صورت نبوده که بیماران میوباتی میتوکندریایی، به هیچ وجه فعالیت بدنی نداشته باشند، زیرا وضعیت این بیماران با عدم تحرک بدتر خواهد شد (شکل ۳).



شکل ۳. تأثیر تمرینات هوایی در بدتر شدن وضعیت میوباتی میتوکندریایی
(خاکستری = سالم و سیاه = جهش یافته)


از سوی دیگر با توجه به بالا بودن سهم *mtDNA* سالم در سلول‌های ماهواره‌ای بیماران مبتلا به میوباتی میتوکندریایی، این گروه تحقیقاتی فرضیه تازه‌ای را ارائه کردند، مبنی بر اینکه سهم ژنوم میتوکندریایی سالم در اثر تمرینات قدرتی با تحریک سلول‌های ماهواره‌ای و بیوژنز میتوکندریایی، افزایش می‌یابد. از این‌رو، با استفاده از یک برنامه ۱۰ هفته‌ای تمرینات قدرتی یک طرفه در شش بیمار مبتلا به نقص عملکرد میتوکندریایی (که سهم *mtDNA* سالم در آن‌ها

بیشتر بود) و چهار بیمار مبتلا به جهش‌های نقطه‌ای ارشی مادرزادی (با سهم ۵۰ درصدی جهش‌یافته) فرضیه خود را بررسی کردند. آن‌ها براساس یافته‌های به دست آمده نتیجه گرفتند تمرینات قدرتی علاوه بر توسعه قدرت جسمانی، با تحریک ساز و کار درگیر در بیوژنز میتوکندریایی سلول‌های ماهواره‌ای و انتقال *mtDNA* سالم به درون تارهای موجود، می‌تواند در توسعه عملکرد میتوکندریایی افراد مبتلا به جهش‌های خود به خودی نقش مهمی را ایفا کند (۳۴).

باقیه به نبود اطلاعات کافی در مورد نقش استرس اکسیداتیو (حین فعالیت‌های بدنی) در بروز آسیب‌های *mtDNA* و همچنین اهمیت آن در بروز فرایند پیری، تصمیم بر آن شد تأثیر فعالیت‌های هوایی با شدت مختلف روی جهش‌های *mtDNA* مورد مطالعه قرار بگیرد.

روش تحقیق

در مطالعه حاضر ۶۰ سر موش صحرایی *Wistar* ۱۴۸۴۸ دو ماهه نر انتخاب و به صورت تصادفی در شش گروه مختلف جایگزین شدند. برای کنترل عوامل و شاخص‌های فیزیولوژیکی پایه، ۱۰ سر در قالب گروه *Con₁* در دوماهگی کشته شدند. دو گروه ۱۰ تایی از آزمودنی‌ها در دو برنامه تمرینی مختلف (برنامه سه ماهه، پنج جلسه در هفته) شرکت داشتند. برنامه تمرینی این دو گروه با شدت ۱۰ متر در دقیقه و مدت ثابت ۲۰ دقیقه (دویden روی نوارگردن الکتریکی با شیب ۶ درجه) شروع شد (شیب دستگاه تا انتهای برنامه ثابت بود). برنامه تمرینی این دو گروه تا رسیدن به شدت ۲۰ متر در دقیقه (انتهای هفته سوم) مشابه بود. پس از آن هریک از گروه‌ها در برنامه‌های خاص خود تمرین داده می‌شدند. شدت برنامه گروه *E₂₀* تا پایان دوره تمرین ثابت بود، اما مدت فعالیت این گروه بنابر برنامه تعیین شده به تدریج به حدود ۴۰ دقیقه رسید. درحالی‌که آزمودنی‌های گروه *E₄₀* با پیروی از برنامه خود توانستند در انتهای دوره شدت فعالیت دویden ۴۰ متر در دقیقه را برای ۲۰ دقیقه تحمل کنند (افزایش ۲ متر در دقیقه در هر هفته) (شکل ۴).



روزهای تمرین

شکل ۴- برنامه سه ماهه تمرینات بدنی موش های صحرائی گروه E40 و E20 هنگامی که خطوط سیاه رنگ به عنوان فعالیت در نظر گرفته شود، خطوط خاکستری معرف مدت فعالیت بندی خواهد بود و بر عکس.

سایر آزمودنی ها به صورت تصادفی در سه گروه غیرفعال جایگزین شدند. آزمودنی های گروه Con₂ برای کنترل شرایط نگهداری در ۵ ماهگی کشته شدند. دو دسته از سه گروه فوق در انتهای دوره فقط برای یکبار روی نوار گردن دویدند. شدت فعالیت گروه CE₂₀ مشابه گروه E₂₀ بود، در حالی که آزمودنی های گروه CE₄₀ با شدت ۴۰ متر در دقیقه روی نوار گردن دویدند. پس از جراحی کلیه آزمودنی ها و برداشت عضله اسکلتی نعلی به عنوان بافت پیکری غیرقابل تقسیم، آزمایش های مولکولی انجام شد.

حیوانات مورد آزمایش در این تحقیق نیز در قفس های پلی کربنات نگهداری شدند. دمای مطلوب سالن نگهداری حیوانات در حدود ۲۰-۲۴ درجه سانتی گراد و رطوبت نسبی نیز در حدود ۵۵-۶۰ درصد کنترل می شد. در این تحقیق سعی شد تا میزان نوردهی به صورت ۱۲-۱۲ ساعت رعایت شود.

برای تغذیه آزمودنی‌ها، روزانه ۱۰۰ گرم پلت^۱ همراه با یک بطری ۵۰۰ میلی‌لیتری آب در اختیار هر قفس (۵ سر موش صحرایی نر، بالغ دو ماهه با میانگین وزن ۲۰۰ گرم) قرار داده می‌شد که با افزایش وزن حیوانات به مرور زمان به میزان غذای آن‌ها افزوده می‌شد.

در تحقیق حاضر برای تشخیص و تعیین میزان جهش mtDNA عضلات اسکلتی از روش‌های Multiplex PCR و توالی خوانی و برای بررسی محصولات PCR از ژل Multiplex PCR به صورت زیر تهیه شد:

Taq 0.5u	OMSO	ONPf1 10 pmol/ μ l	ONP1210 10 pmol/ μ l	ONPR1 10 pmol/ μ l	ONPR2 10 pmol/ μ l	DNA 50 ng/ μ l	dNTP 10 mmol	PCR buffer 10x +Mgcl2	H2O
1 μ l	1.3 μ l	0.7 μ l	1 μ l	0.7 μ l	1 μ l	1 μ l	0.5 μ l	2.5 μ l	15.3 μ l

در واکنش Multiplex از پرایمرهای L4395 و H5164 به عنوان کنترل داخلی و پرایمرهای Rat.H12946 و Rat.L7454 برای تشخیص حذف معمولی mtDNA استفاده شد.

نام آغازگر	موقعیت نوکلئوتیدی	توالی آغازگر
L4395f1	4395-4418	5'-AGGACTTAACCAGACGCCAACACG-3'
H5164R1	5164-5145	5'-CCTCTTTCTGATAGGCGGG-3'
Rat.L7454f2	7454-7475	5'-CATCCGAAGACGTCTGCACTC-3'
Rat.H12946R2	12946-12925	5'-AGGGCTCAGGC GTTGGTGTAC-3'

برنامه Multiplex PCR به صورت ذیل انجام شد:

واسرشتی^۱ اولیه ۹۵ درجه سانتی گراد به مدت ۲ دقیقه
 واسرشتی^۲ ۹۵ درجه سانتی گراد به مدت ۲۰ ثانیه }
 اتصال^۳ ۶۰ درجه سانتی گراد به مدت ۳۰ ثانیه }
 طویل شدن^۴ ۷۲ درجه سانتی گراد به مدت ۶۰ ثانیه } تعداد چرخه ها^۵ ۳۵ دور
 طویل شدن نهایی ۷۲ درجه سانتی گراد به مدت ۱۰ دقیقه

توالی نمونه های *mtDNA* به روش خودکار^۶ تعیین شد. برای کنترل شرایط تحقیق، برخی از پارامترهای فیزیکی اندازه گیری شد. اندازه گیری حجم قلب با استفاده از تغییرات حجم جابه جا شده (سرم فیزیولوژیکی) حین غوطه ور کردن این اندام در دستگاه اندازه گیر، انجام شد. در بررسی متغیرهای فوق از آزمون های (آنالیز واریانس)^۷ و کروسکال والیس^۷ استفاده شد.

نتایج و یافته های تحقیق

- تفاوت های مشاهده شده در متغیرهای کنترل، به این نکته اشاره دارد که استقامت قلبی - عروقی هر دو گروه تمرین کرده (E_{40} & E_{20}) بیشتر از سایر گروه های مورد مطالعه است. این تفاوت در گروه E_{20} بسیار بیشتر بود. با مقایسه میانگین کار انجام شده در گروه های مختلف، هیچ گونه اختلافی بین دو گروه E_{40} و E_{20} دیده نشد. ولی هنگام مقایسه گروه های شرکت کننده در فعالیت های هوایی شدید، مشخص شد میانگین کار انجام شده در گروه E_{40} ۴/۳ برابر گروه E_{20} است. در صورتی که میانگین میزان کار انجام شده در گروه E_{20} ۱/۲ برابر گروه E_{40} است. علت عدمه اختلاف مشاهده شده در دو دسته فوق، به میزان شدت فعالیت انجام شده بر می گردد، زیرا تحمل شدت ۴۰ متر در دقیقه برای آزمودنی های غیرفعال بسیار مشکل است.

1- Denaturation

2- Cycles

3- Annealing

4- Extension

5- Automate


6- ANOVA

7- Kruskal - Wallis

در کل این اختلاف بیانگر تأثیر مثبت تمرینات هوایی بر توانایی انجام فعالیت بدن در گروه‌های فعال است.

نتایج حاصل از بررسی میانگین حجم قلب گروه‌های مختلف، تقریباً مشابه نتایج کار انجام شده بود. میانگین حجم قلب گروه E_{20} در حدود $4/2$ درصد بیشتر از گروه E_{40} است. این در حالی است که میانگین حجم قلب گروه E_{40} در حدود $1/88$ برابر گروه CE_{40} و گروه E_{20} $1/93$ برابر گروه CE_{20} می‌باشد. این اختلاف نشان دهنده تأثیر مثبت تمرینات هوایی روی حجم قلب گروه‌های تمرین کرده است (تفاوت 88 درصدی در مقایسه فعالیت 40 متر در دقیقه و 93 درصدی در فعالیت 20 متر در دقیقه). البته تأثیر فعالیت‌های هوایی با شدت متوسط نسبت به فعالیت‌های شدید بیشتر احساس شد. علت اختلاف مشاهده شده را باید در مدت انجام فعالیت‌های هوایی جست و جو کرد، زیرا مدت انجام فعالیت‌های متوسط تقریباً دو برابر فعالیت‌های شدید بود. از این‌رو می‌توان نتیجه گرفت هر دو نوع فعالیت‌های هوایی در ارتقای استقامت قلبی - عروقی تأثیر مثبت دارند. اما با توجه به نتایج به دست آمده از بررسی‌های وزن و حجم قلب، استنباط می‌شود که تأثیر مثبت فعالیت‌های هوایی با شدت متوسط بیش از فعالیت‌های شدید است (جدول ۱).

پس از بررسی ژل آکارز (2 درصد) مربوط به محصولات برنامه *Multiplex PCR* مشخص شد حذف $4/6$ کیلویازی فقط در گروه E_{40} رخ داده است. به عبارتی، در هیچ یک از گروه‌ها حذف یادشده مشاهده نشد. از این یافته می‌توان نتیجه گرفت که یک وهله فعالیت بدنی هوایی با شدت‌های مختلف نمی‌تواند موجب بروز حذف معمولی *mtDNA* عضله اسکلتی در موش‌های صحرایی نوع *Wistar*₁₄₈₄₈ شود. علاوه بر آن، تمرینات بدنی هوایی با شدت متوسط نیز در بروز حذف *mtDNA* عضله نعلی هیچ گونه دخالتی ندارد، در حالی که تحت تأثیر تمرینات هوایی شدید (40 متر در دقیقه)، حذف $4/6$ کیلویازی در *mtDNA* عضله نعلی آزمودنی‌های مورد مطالعه دیده شد (شکل ۵).



شکل ۵ - ژل دو درصد آگارز مربوط به محصولات Multiplex PCR

جدول ۱ - متغیرهای اندازه گیری شده در گروههای مختلف

<i>E₄₀</i>	<i>E₂₀</i>	<i>CE₄₀</i>	<i>CE₂₀</i>	<i>Con₂</i>	<i>Con₁</i>	گروهها	پارامترهای اندازه گیری شده
۳۲۶/۰۰	۳۲۵/۲۰	۳۲۱/۶۰	۳۰۴/۰۰	۳۱۵/۰۰	۱۹۱/۱۰	میانگین وزن بدن آزمودنی ها (g)	
۲۰۵/۰۰	۲۰۹/۴۰	۱۹۶/۲۰	۱۸۵/۴۰	۱۹۲/۲۰	۱۱۰/۰۰	میانگین وزن عضله نعلی آزمودنی ها (mg)	
۱/۲۹	۱/۳۵	۱/۱۱	۱/۱۴	۱/۱۱	۰/۶۸	میانگین وزن قلب آزمودنی ها (g)	
۲/۱۳	۲/۲۲	۱/۱۳	۱/۱۵	۱/۱۲	۰/۷۶	میانگین حجم قلب آزمودنی ها (ml)	
۲۸/۰۹	۲۸/۰۲	۶/۴۲	۲۲/۵۵	-	-	میانگین کار انجام شده (kg/m)	
۴۹۷۲	-	-	-	-	-	میزان حذف mtDNA عضله نعلی (bp)	

بحث و نتیجه گیری

هرگونه افزایشی در تولید درونزادگونه های فعال اکسیژن می تواند با برهم زدن تعادل اکسیدانی / آنتی اکسیدانی موجبات بروز استرس اکسیداتیو و آسیب های واردہ به مولکول های زیستی، بویژه ژنوم میتوکندریالی را فراهم آورد (۷، ۱۸، ۲۵، ۲۸، ۳۵ و ۳۶). با توجه به اهمیت آسیب های ژنوم میتوکندریالی در کاهش تولید انرژی زیستی و روند پیری و نقش فعالیت های هوایی در بروز استرس اکسیداتیو، فرض شد فعالیت های هوایی سنگین می توانند در بروز و

تجمع حذف‌های میتوکندریایی دخالت داشته باشد.

نتایج حاصل از مطالعه حاضر نشان می‌دهد تأثیر تمرینات هوایی با دو شدت متفاوت در ارتقای استقامت قلبی - عروقی قابل توجه است، با این حال نباید از تأثیر منفی تمرینات هوایی شدید در بروز حذف ۴/۶ کیلوگرمی در ژنوم میتوکندری در عضله نعلی چشمپوشی کرد این یافته تأییدکننده نتایج گروه هالر (۲۰۰۲) در مورد آثار منفی تمرینات هوایی در بروز حذف‌های میتوکندریایی است (۳۴). از سوی دیگر، برخلاف مطالعات ساکایی (۱۹۹۹) (۲۷) و ای وای (۲۰۰۲) (۱۷)، هیچ‌گونه حذفی در اثر شرکت در یک وهله فعالیت هوایی با شدت‌های مختلف مشاهده نشد. تفاوت مشاهده شده بین یافته‌های این دو تحقیق، می‌تواند به دلیل حجم فعالیت‌های ورزشی باشد. از آنجاکه شدت فعالیت بدنی در این تحقیق مشابه مطالعه ساکایی و همکارانش است، از این رو احتمالاً مدت فعالیت بدنی عامل بروز جهش در *mtDNA* عضلات اسکلتی بشمار می‌رود. زیرا آزمودنی‌های مطالعه ساکایی و همکارانش تا حد واماندگی فعالیت داشتند، اما مدت فعالیت در تحقیق حاضر فقط ۲۰ دقیقه طول می‌کشید.

به طور کلی می‌توان گفت شرکت در تمرینات شدید هوایی می‌تواند در بروز و تراکم حذف‌های بزرگ *mtDNA* دخالت داشته باشد، در حالی که تمرینات هوایی با شدت متوسط، نه تنها موجب بروز حذف‌های بزرگ در *mtDNA* عضلات اسکلتی نمی‌شود، بلکه در توسعه توان هوایی تا حد قابل توجهی مؤثر است. از طرفی، یک وهله فعالیت بدنی هوایی با شدت‌های مختلف نمی‌تواند موجب بروز حذف معمولی *mtDNA* در عضله موش‌های صحرایی نوع *Wistar*₁₄₈₄₈ شود. بدین ترتیب نباید از تأثیر مخرب تمرینات هوایی سنگین در تسریع فرایند پیری و بروز بیماری مربوط به آن و نقش این گونه تمرینات در بدتر شدن وضعیت برخی از بیماران، بویژه بیماران میوپاتی میتوکندریایی، چشمپوشی کرد. با توجه به مطالب فوق، برای روشن شدن تأثیر تمرینات ورزشی مختلف بر آسیب‌های واردہ به ژنوم میتوکندریایی، تحقیقات بیشتری پیشنهاد می‌شود.

تقدیر و تشکر

در پایان، از همکاری مراکز پژوهشی مختلف از جمله دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تهران، مرکز ملی تحقیقات ژنتیک و تکنولوژی زیستی، پژوهشکده تربیت بدنی و ورزش، انسیتو پاستور و دانشگاه تبریز در پیشبرد مطالعه حاضر قدردانی می شود.

منابع و مأخذ

- 1- Ames, B.N., M.K. Shinegawa, and T.M. Hagen. "Oxidants, antioxidants, and the degenerative diseases of aging" *Proceeding of National Academy of Sciences of USA* 1993, 90: PP: 7915-7922.
- 2- Beckman, K.B. and B.N. Ames. "The free radical theory of aging matures", *Physiological Reviews* 1998, 78, PP: 547-557.
- 3- Bruce, RT. "The Biolog of Aging", *the mount sinai journal of medicine*. 2003, Vol. 70(1).
- 4- Clayton, D.A., J.N. Doda and E.C. Friedberg. "The absence of a pyrimidine dimmer repair mechanism in mammalian mitochondria", *Proceeding of the National Academy of Sciences USA* 1974, 71: PP: 2777-2781.
- 5- Dennog, C., A. Hartmann, G. Frey, and G. Speit. "Detection of DNA damage after hyperbaric oxygen (HBO) therapy" *Mutagenesis* 1996, 11: PP: 605-609.
- 6- Finch, C.E., and R.R., Tanzi. "Genetics of aging" *Science*;1997, 278: PP: 407-411.
- 7- Fleming, J.E., J. Miquel, S.F. Cottrell, et al. "Is cell aging caused by respiration - dependent injury to the mitochondrial genome?" *Gerontology* 1982, 28: PP: 44-53.
- 8- Fridovich, I. "Superoxide radical: An endogenous toxicant" *Annual Review*

of Pharmacology and Toxicology 1983, 23: PP: 239-257.

9- Fridovich, I., and B.A. Freeman. "Antioxidant defenses in the lung" Annual Review of Physiology 1986, 8: PP: 693-702.

10- Gross, N.J., G.S. Getz and M. Rabinowitz. "Apparent turnover of tissues of the rat" Journal of Biological Chemistry 1969, 244: PP: 1552-1562.

11- Halliwell, B., and J.M.C. Gutteridge. "Free Radicals in Biology and Medicine" 2nd ed. Oxford University Press (Clarendon), New York.1984.

12- Halliwell, B., J.M.C. Gutteridge. Role of free radicals and catalytic metal ions in human disease: An overview" Methods in Enzymology 1990, 186: PP: 1 - 85.

13- Hamilton, M., "Does oxidative damage to DNA increase with age?" Proc. Natl. Acad. Sci. USA. 2001, Vol. 98, Issue 18, PP: 10469-10474.

14- Hardmeier, R., H. Hoeger, S. Fang - Kircher, A. Khoschisorur, and G. Lubec. "Transcription and activity of antioxidant enzymes after ionizing irradiation in radiation - resistant and radiation - sensitive mice" Proc. Natl. Acad. Sci. USA 1997, 94: PP: 7572-7576.

15- Harman, D. "Aging: A theory based on free radical and radiation chemistry" Journal of Gerontology 1956, 11: PP: 298-300.

16- Houshmand, M., "Mitochondrial DNA Mutation pathogenicity and inheritance" Ph.D. thesis in GOTEborg University, Sweden.1999.

17- Iwai, K., M. Miyao, Y. Wadano, and Y. Iwamura. "Dynamic changes of deleted mitochondrial DNA in human leucocytes after endurance exercise" Eur J Appl Physiol 2003, 88: PP: 515-519.

18- Linnane, A.W., C. Zhang, A. Baumer, and P. Nagley. "Mitochondrial DNA mutation and the ageing process" In: bioenergy and pharmacological

- intervention. *Mutal Res* 1992, 27: PP: 195-208.
- 19- *Mello Filho, A.C., M.E. Hoffmann, and R. Meneghini. "Cell killing and DNA damage by hydrogen peroxide are mediated by intracellular iron"* *Biochemical Journal* 1984, 218: PP: 273-275.
- 20- *Meydani, M., and W.J. Evans. "Free radicals, exercise, and aging"* In: *free radicals aging*, B.P. Yu, (ed) 1993, PP: 183-204, CRC Press, Boca Raton, FL.
- 21- *Mitsuyoshi, M., and T. Kaneko. "The chemistry of reactive oxygen species and related free radicals"* In: *Free radicals in exercise and aging*, Z. Radak (ed.), 2000, PP: 1- 34.
- 22- *Ozawa, T. "Mechanism of somatic mitochondrial DNA mutations associated with age and diseases"* *Biochem Biophys Acta* 1995, 1271: PP: 177-189.
- 23- *Ozawa, T. "Genetic and functional changes in mitochondria associated with aging"* *Physiological Reviews* 1997, 77: PP: 425-464.
- 24- *Quantaniha, A.T., L. Packer, J.M.S. Davies, T. Racanelli, and K.J.A. Davies. "Membrane effects of vitamin E deficiency Bioenergetics and surface charge density studies of skeletal muscle and liver mitochondria"* *Annual of the New York Academy of Sciences* 1982, 399: PP: 32-47.
- 25- *Radak, Z. and S. Goto. "The effects of exercise, aging and caloric restriction on protein oxidation and DNA damage in skeletal muscle"* In: *Oxidative stress in skeletal muscle, A.Z. Reznick, L. Packer, C.K. Sen, J.O. Holloszy, and M.J. Jackson (eds.)*, 1998, PP: 89-103. Birkhauser, Basel, Switzerland.
- 26- *Reznick, A.Z., E. Carmeli, and G. Lavian. "The role of antioxidant nutrition in exercise and aging".* In: *Free radicals in exercise and aging*, Z.

- Radak, (ed), 2000, PP: 73-117.
- 27- Sakai, Y., Y. Iwamura, J. Hayashi, N. Yamamoto, N. Ohkoshi and H. Nagata. "Acute exercise cause mitochondrial DNA deletion in Rat restriction, and aging" *Science* 1999, 273: PP: 59-63.
- 28- Sawyer, D.T. "Oxygen Chemistry" Oxford University Press, New York. 1991.
- 29- Sohal, R.S., and R. Weindruch. "Oxidative stress, caloric restriction, and aging" *Science* 1996, 273: PP: 59-63.
- 30- Stadtman, E.R. "Metal ion catalyzed oxidation of protein: Biochemical mechanism and biological consequences" *Free Radical Biology and Medicine* 1990, 9: PP: 315-325.
- 31- Stadtman, E.R."Protein oxidation and aging" *Science* 1992, 257: PP: 1220-1224.
- 32- Stadtman, E.R. and C.N. Oliver. "Metal ion - catalyzed oxidation of proteins" *Journal of Biological Chemistry* 1991, 266: PP: 2005-2008.
- 33- Stroz, G., L.A. Tartaglia. S.B. Fsr, and B.N. Ames. "Bacterial defenses against oxidative stress" *Trends Genet.* 1990, 6: PP: 363-368.
- 34- Taivassalo T, Shoubridge E, Tarnopolsky M, lofberg M, Arnold D, Haller RG. "Resistance exercise training as therapy in patients with sporadic mtDNA mutations" 2002. <http://www.mdausa.org/publications>
- 35- Wallace, D.W. "Mitochondrial genetic" A paradigm for aging and degenerative disease? *Science* 1992, 256: PP: 628-632.
- 36- Yu, B.P. "Free Radicals in Aging" CRC Press, Boca Raton, FL. 1993.

