

# اثر بازدارنده رشد فولیکولی روغن پنبه دانه هیدروژنه روی تخدمان موش ماده

دکتر سید مدایت الله رسیدی<sup>۱</sup> دکتر محمد اسلامیان<sup>۱</sup>

آسان‌کشی شدند. از هر تخدمان پس از ثبوت در فرمالین ۱۰ درصد برشهای طولی - وسطی (MID-Sagittal sections) به ضخامت ۵ میکرومتر تهیه و به روش H&E رنگ‌آمیزی گردید. علت انتخاب چنین برشی ایجاد تشابه میدان میکروسکوپی و امکان قضاوت نسی بروی هر تخدمان بود.

مطالعه به صورت بررسی انواع فولیکولها و شمارش فولیکولی در هر برش بافتی از گروههای مورد آزمایش و گروه شاهد انجام گردید. برای شمارش فولیکولی ابتدا از هر تخدمان برشهای سریال به فواصل ۱۰ میکرومتر از مرکز به سمت خارج تهیه و با روش مورفومتری (۹) تعداد کل فولیکولها محاسبه گردید، لیکن با توجه به هدف مطالعه که صرفاً بررسی تغییرات روند رشد و تکامل فولیکولی بود، از هر نمونه در درشت‌نمایی ۴۰ و از وسطی ترین برش شمارش فولیکولی به صورت مارپیچ از نقطه‌ای از کورتکس در جهت عقربه ساعت به سمت مدولابعمل آمد. شمارش به ترتیک انواع فولیکول صورت گرفت. ارقام بدست آمده با روش میانگین و انحراف معیار و با استفاده از آزمون "t" (t-test) مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

## نتایج

در این بررسی فولیکولها به صورت نوع اول، نوع دوم، بالغ (فولیکول گراف) و جسم آتریک دسته‌بندی شدند. اجسام زرد بمطور کیفی مورد مطالعه قرار گرفته و در شمارش مظاوم نگردیدند. علت این امر با توجه به هدف بررسی، صرفاً مراحل رشد و تکامل فولیکولها تا مرحله بالغ فولیکولی (فولیکول دو گراف) مورد نظر بوده است.

شمارش فولیکولی در تخدمانهای راست و چپ نشان داد که جیره غذایی حاوی ۱۰ درصد روغن پنبه دانه هیدروژنه در سه مقطع سنتی تعیین شده در مقایسه با گروه شاهد باعث کاهش در میانگین انواع فولیکولها شده است. این کاهش در زیر گروههای سنتی شش و نه هفتگی بیویزه در تخدمانهای راست چشمگیرتر بود. در زیر گروه سنتی دوازده هفتگی که آغاز مرحله بالغ جنسی است، اثرات ملایمتر بود. این وضعیت عمده‌ای در تعداد فولیکولهای نوع اول و دوم آشکارتر بود (جدا ۱-۳). تخدمانهای چپ در مقایسه با تخدمانهای راست در هر سه مقطع سنتی، تغییرات بیشتری را نشان دادند ( تصاویر ۶-۸).

## بحث

در مطالعه حاضر نشان داده شد که در موشهای تقذیه شده با جیره غذایی روغن پنبه دانه هیدروژنه تعداد فولیکولهای نوع اول و دوم نسبت به موشهای شاهد در همه زیر گروهها کاهش قابل توجهی داشته است، در حالی که تعداد اجسام آتریک برعکس افزایش نشان داده است. روغن پنبه دانه هیدروژنه باعث می‌شود ماده مهارکننده اتصال (RBI) (Receptor binding inhibitor) یا FSH به گیرنده در مایع فولیکولی افزایش یابد. ترکیب FSH-RBS میزان استروژن‌ها را به شدت کاهش داده و برعکس باعث تجمع آندروژن‌ها می‌شود. این تغییر می‌تواند یکی از علل اصلی کنلی روند تکثیر سلولهای گرلتوولزا در نهایت آقرزی فولیکولهای در حال رشد باشد (۸). در هر حال تخدمانهای راست بیش از تخدمانهای چپ واکنش نشان داده‌اند که علت آن به درستی روشن نیست.

مجله دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران، دوره ۲۶، شماره ۲، ۱۱۹-۱۲۲، (۱۳۸۰)

تعداد ۶۰ موش سفید ماده از نژاد BALB/c در سن سه هفتگی انتخاب و در شرایط یکسان به دو گروه یکی گروه روغن پنبه دانه هیدروژنه و دیگری گروه شاهد تقسیم شدند. هر گروه به سه زیر گروه شش هفتگی، نه هفتگی و دوازده هفتگی تقسیم شدند. موشهای گروه اول به مدت سه هفتگه در مقطع سنتی مربوطه با جیره غذایی می‌شوند. موشهای گروه شاهد نیز به همان ترتیب با هیدروژنه بمطور آزاد تقذیه شدند. موشهای گروه شاهد نیز به همان ترتیب با غذای معمولی تقذیه شدند. در پایان هر دوره موشها بیهوش شده و پس از بیهوشی، تخدمانها مورد مطالعه بافت‌شناسی قرار گرفتند و نتایج زیر بدست آمد: موشهای تقذیه شده با روغن پنبه دانه هیدروژنه در مقایسه با موشهای شاهد، کاهش تعداد انواع فولیکول‌ها و برعکس از دیگر تعداد اجسام آتریک را نشان دادند. کاهش فولیکول در مقطع سنتی شش و نه هفتگی و نیز در فولیکول‌های نوع اول آشکارتر بود. علت پدیده فوق می‌تواند لشباع شدن اسید لیتولنیک موجود در روغن پنبه دانه هیدروژنه باشد.

واژه‌های کلیدی: رشد فولیکولی، روغن پنبه دانه، تخدمان، موش.

بررسیهای انجام شده نشان داده‌اند که روغن‌های گیاهی خوارکی مایع از قبل رونق نزدیک روغن کنجد و روغن پنبه دانه به علت دارا بودن مقادیر بالای از اسید لیتولنیک، محرك رشد و بلوغ جنسی و تحریک رشد غدد پستانی در موش ماده بوده‌اند (۷، ۶، ۴، ۲). در ترکیبات روغن‌های گیاهی خوارکی جامد عمدتاً از روغن پنبه دانه هیدروژنه استفاده می‌شود. اسیدهای چرب موجود در این روغنها اشبع و بی اثر می‌گردند (۱). اثرات بازدارنده اختلال در روند رشد فولیکولی و روند کار عادی دستگاه تناسلی ماده، روغن پنبه دانه هیدروژنه در مقایسه با روغن نزدیک خرگوش نشان داده شده است (۸ و ۲). این اثرات هر چند از لحاظ مهار رشد و تکثیر بی‌رویه سلولها در مقایسه با خطرات کارسینوزن‌تیکی روغن‌های گیاهی مایع مفید به نظر می‌رسد، لیکن بروز اختلال در فولیکول‌های رشد طبیعی تخدمان احتمالاً یکی از عوارض مصرف آن است (۸ و ۲). اثرات یاد شده در تخدمان خرگوش در دوره‌های رویانی و جنتی نیز نشان داده شده است (۸). هدف از این پژوهش بررسی اثرات روغن پنبه دانه هیدروژنه بر روند رشد فولیکولی در موش ماده بوده است.

## مواد و روش کار

تعداد ۶۰ موش سفید ماده از نژاد BALB/c در سن سه هفتگی انتخاب گردیده و در شرایط یکسان به دو گروه، یکی گروه روغن پنبه دانه هیدروژنه و دیگری گروه شاهد تقسیم شدند. هر گروه خود بر اساس مقطع سنتی به سه زیر گروه ده تایی، به ترتیب شش هفتگی، نه هفتگی و دوازده هفتگی تقسیم شدند. موشهای گروه روغن پنبه دانه هیدروژنه هر یک به مدت سه هفتگه با جیره غذایی استاندارد مخلوط با ۱۰ درصد از ماده خشک روغن پنبه دانه هیدروژنه استاندارد بمطور آزاد تقذیه گردیدند.

موشهای مورد آزمایش همراه با شاهدهای مربوطه در پایان هر دوره بالاگهله با تزریق درون صفاقی تیوبینتال سدیم ۵/۰ درصد بیهوش شده، تخدمانهای راست و چپ هر یک ابتدا بیوسی گردیده و پس از ت蒙تیرلاری

(۱) گروه آورژنیکی علوم پایه دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهید چمران (علوم) هواز - ایران.

(۲) دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی هواز، هواز - ایران.






تصویر ۱ - تخدمان راست گروه شاهد. زیر گروه سنی ۶ هفتگی (H&amp;E × ۴۰).



تصویر ۲ - تخدمان راست گروه شاهد. زیر گروه سنی ۹ هفتگی. F1) فولیکول نوع اول، F2) فولیکول نوع دوم و (FM) فولیکول بالغ (H&amp;E × ۴۰)



تصویر ۳ - تخدمان راست گروه شاهد، زیر گروه سنی ۱۲ هفتگی. F1) فولیکول نوع اول، F2) فولیکول نوع دوم و (FM) فولیکول بالغ، (H&amp;E × ۴۰)

جدول ۱ - مقایسه میانگین و انحراف معیار تعداد فولیکولهای تخدمانهای راست و چپ در موشهای ۶ هفته

انواع فولیکولها	تعداد ۱۰ موش		گروه روغن پنبه دانه هیدروژنه	گروه شاهد
	تعداد ۱۰ موش	تعداد ۱۰ موش		
فولیکول نوع اول	۵/۵ ± ۱/۹۸	۶/۱۲ ± ۱/۱۳	تخدمان چپ	تخدمان راست
فولیکول نوع دوم	۴/۱۵ ± ۱/۱۸	۵/۸ ± ۱/۱۶	تخدمان چپ	تخدمان راست
فولیکول بالغ	۱۰/۱۲ ± ۱/۱۲۲	۹/۹ ± ۱/۱۹۲	تخدمان چپ	تخدمان راست
جسم آرتیک	۲/۱۵ ± ۱/۱۰۲	۲ ± ۰/۷۷	تخدمان چپ	تخدمان راست
	۱/۱۸ ± ۱/۱۶			

جدول ۲ - مقایسه میانگین و انحراف معیار تعداد فولیکولهای تخدمانهای راست و چپ در موشهای ۹ هفته

انواع فولیکولها	تعداد ۱۰ موش		گروه روغن پنبه دانه هیدروژنه	گروه شاهد
	تعداد ۱۰ موش	تعداد ۱۰ موش		
فولیکول نوع اول	۵ ± ۱/۴۱	۶/۱۴ ± ۱/۴۹	تخدمان چپ	تخدمان راست
فولیکول نوع دوم	۲/۷ ± ۱/۱۲۶	۴/۱ ± ۱/۱۴۴	تخدمان چپ	تخدمان راست
فولیکول بالغ	۶/۶ ± ۱/۶۲	۸/۷ ± ۲/۱۲	تخدمان چپ	تخدمان راست
جسم آرتیک	۳/۳ ± ۰/۹	۳ ± ۱/۳۴	تخدمان چپ	تخدمان راست
	۱/۱۸ ± ۱/۱۶			

جدول ۳ - مقایسه میانگین و انحراف معیار تعداد فولیکولهای تخدمانهای راست و چپ در موشهای ۱۲ هفته

انواع فولیکولها	تعداد ۱۰ موش		گروه روغن پنبه دانه هیدروژنه	گروه شاهد
	تعداد ۱۰ موش	تعداد ۱۰ موش		
فولیکول نوع اول	۶/۳۶ ± ۱/۹	۸/۱۶ ± ۲/۱۵۲	تخدمان چپ	تخدمان راست
فولیکول نوع دوم	۴ ± ۱/۱۶۷	۳/۱۸ ± ۱/۱۹۳	تخدمان چپ	تخدمان راست
فولیکول بالغ	۱۰/۰۹ ± ۱/۱۹۷	۱۱/۱۹ ± ۲/۲۱	تخدمان چپ	تخدمان راست
جسم آرتیک	۱/۱۹ ± ۱/۱۷	۱/۱۷ ± ۱/۱۳۴	تخدمان چپ	تخدمان راست
	۱/۱۸ ± ۱/۱۶			

تأثیرات فوق الذکر در مقطع سنی ۹ هفتگی که موشاها در آستانه بلوغ جنسی بوده‌اند، آشکارتر بوده است. این در حالی است که در مقطع سنی دوازده هفتگی که مرحله بلوغ جنسی است، تأثیرات یادشده ملایمتر بوده است. کندی اثرات کاهش‌دهنگی رشد و نمو فولیکولی توسط روغن پنبه دانه هیدروژنه در مرحله بلوغ جنسی، می‌تواند به علت تأثیرات متقابل هورمونهای جنسی و نیز رشد بیشین فولیکولها باشد.

تجزیه و تحلیل میانگین و انحراف معیار نتایج بدست آمده از شمارش فولیکولی در هر مقطع سنی نشان داد که در موشهای شش هفته بین تعداد فولیکولهای نوع اول، دوم و بالغ در تخدمان راست موشاها گروه روغن پنبه دانه هیدروژنه و موشهای گروه شاهد اختلاف معنی داری ( $P < 0.05$ ) وجود دارد، ولی اجسام آرتیک اختلاف معنی داری ( $P > 0.05$ ) را نشان ندادند.



تخدمانهای چپ در انواع فولیکولها نیز اختلاف معنی داری را نشان ندادند. در مشاهای نه هفته بین تعداد انواع فولیکولها و اجسام آترتیک در گروه روغن پنبه، دانه هیدروژنه و گروه شاهد در هر دو تخدمانها اختلاف معنی داری وجود داشت، ولی بین تعداد فولیکولهای نوع اول و دوم در تخدمانهای چپ اختلاف معنی دار نبود. در مشاهای دوازده هفته بین تعداد فولیکولهای نوع اول و بالغ تخدمانهای چپ گروه روغن پنبه دانه هیدروژنه و گروه شاهد و نیز فولیکولهای نوع دوم تخدمانهای راست اختلاف معنی داری وجود داشت، لیکن بین فولیکولهای نوع اول و بالغ تخدمانهای راست و کلیه اجسام آترتیک در هر دو تخدمانهای راست و چپ اختلاف معنی داری نشان داده نشد.

برخی از گزارشات نشان داده اند که روغن ذرت با دارای بودن میزان بالای اسید لینولئیک (۵۹/۹ درصد) اثر تحریکی بر رشد و نمو فولیکولها داشته و حتی باعث تسریع روند رشد و تکثیر سلولی بافت های دیگر شده است (۱، ۲، ۳، ۴، ۵، ۶).


روغن کنجد نیز با دارای بودن اسید لینولئیک به میزان ۴۳-۴۵ درصد اثرات تحریکی مشابه ای با روغن ذرت نشان داده است (۷). بالعکس روغن پنبه دانه هیدروژنه اثر بازدارنگی رشد سلولی را نشان داده است (۸ و ۹). پی بردن به مکانیسم های دقیق و نحوه تأثیر روغن های فوق الذکر به کار بیشتری نیاز دارد.

### References


1. Abraham, S., Faulkin, L.J. and Mitchell, D.J. (1984): Effects of dietary fat on tumorogenesis in the mouse mammary glands. KNCL, 27: 1421-1429.
2. Faulkin, L.J., Abraham, S., Mitchell, D.J. and Hillyard, A. (1986): Effects of dietary fat on mammary development relative to age and hormones in BALB/c Mice (42295). Proceeding of the society for experimental biology and medicine. 181: 575-585.
3. Noori, M.H., Minaei, B., Shariat, S. and Rashidi, H. (1998): Comparison of the effects of corn oil and fish oil on ovarian folliculogenesis in female rabbit at prenatal stage. Scient. Med. J. 23: 1-9.
4. Rashidi, H. (1989): Effects of corn oil and menhaden fish oil on female mice reproductive system. J. V. F. 44: 1-9.
5. Rashidi, H. and Papahn, A.A. (1986): Study the corcinogenesis effects of corn oil compounds. 3rd Iranian congress of pharmady and pharmacological sciences.
6. Rashidi, H. and Papahn, A.A. (1992): The structure of female mice reproductive tract born from mothers fed with diets containing corn oil and fish oil during pregnancy. Scient. Med. Journal, 14: 35-45.
7. Rashidi, H. (1999): Effects of sesame oil on ovarian follicular growth in female mice. 26th W.V.C. Lyon, France.
8. Shariatzadeh, M., Shariat, S., Rashidi, H. and Rezazadeh, M. (1990): Effects of corn oil and cotton seed oil on structure of female rabbit ovary at embryonic stage. Proceeding of first anatomical congress. Kerman, Irma.
9. Vizzotto, L.M. and Vigilio, F.F. (1991): Morphometric study of the human neonatal ovary. The anatomical record, 237: 201-208.



تصویر ۴ - تخدمان راست گروه روغن پنبه دانه هیدروژنه، زیر گروه سنی ۶ هفتگی (H&E ×۴۰).



تصویر ۵ - تخدمان راست گروه روغن پنبه دانه هیدروژنه، زیر گروه سنی ۹ هفتگی (F1 فولیکول نوع اول، F2 فولیکول نوع دوم و FM فولیکول بالغ. به جسم زرد در سمت چپ بالای تصویر توجه بشود (H&E ×۴۰).



تصویر ۶ - تخدمان راست گروه روغن پنبه دانه هیدروژنه، زیر گروه سنی ۱۲ هفتگی (F1 فولیکول نوع اول، F2 فولیکول نوع دوم و FM فولیکول بالغ. (H&E ×۴۰).



## **Suppressive effect of hydrogenated cotton seed oil on follicular growth in female mice**

**Rashidi, H.<sup>1</sup>, Islamian, M.H.<sup>2</sup>**

<sup>1</sup>*Department of Basic Sciences, Faculty of Veterinary Medicine, Shahid Chamran Ahvaz University, Ahvaz - Iran.* <sup>2</sup>*School of Pharmacy, Ahvaz Medical Sciences University, Ahvaz - Iran.*

Sixty white female BALB/c mice at age 6 weeks were divided into two groups: Hydrogenated cotton seed oil and control. Each group was divided into three subgroups: 6, 9 and 12 weeks. The first group was fed with diet containing 10% hydrogenated cotton seed oil for 3 weeks, but controls with ordinary diet, ad libitum. Biopsy and histological studies showed decrease in number of follicles, but increase of atretic bodies. This was higher in 6 and 9 weeks. Decrease was more for primary follicles. The above phenomenon could be due to saturation of linoleic acid contained in hydrogenated cotton seed oil.

**Key words :** Follicular growth, Hydrogenated cotton seed oil, Ovary, Mice.

