

## ارزیابی ماهیان مولد ماده کپور نقره‌ای برای اصلاح نژاد

دکتر قباد آذری تاکامی<sup>۱</sup> دکتر رضا شبیدی<sup>۲</sup> مهندس افشین عادلی<sup>۳</sup>

ارتفاع(Trunk height) (این شاخص نسبت طول استاندارد به حداکثر ارتفاع بدن ماهی بر حسب سانتیمتر است<sup>(۴)</sup>، انجام گرفت.

مجله دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران ، دوره ۵۵ ، شماره ۲ ، ۴۳ - ۵۰ ، (۱۳۷۹)

### مواد و روش کار

برای این بررسی از ماهی کپور نقره‌ای با نام علمی *Hypophthalmichthys molitrix valenciennes* 1844 به دلیل داشتن خصوصیاتی مانند: استعداد رشد سریع، استفاده از حلقه اول زنجیره غذایی موجود در آب، سازگاری مناسب، نیاز به حداقل امکانات پرورشی، پوشش دادن ۵۰ تا ۸۵ درصد از ماهیان استخراهای پرورشی کشت توان کپور ماهیان در ایران و بالاخره گوشت لذیذ و عالمه‌پسند بودن آن در اولویت ارزیابی قرار گرفت<sup>(۲)</sup>.

در این ارزیابی ضمن درنظر گرفتن مواردی چون سلامتی ظاهری، عدم ضرب دیدگی، تناسب اندام و کوچک بودن سر به طور نسبی، ۸۵ مولد نر و ۱۸۶ مولد ماده انتخاب گردیدند. سپس ماهیان با پلاکهای مشابه پلاک اتکیز پلاک‌گذاری گردیدند. سن مولدین با استفاده از فلس تعیین گردید و زیست‌سنگی با استفاده از تخته اندازه‌گیری و گونیا در مواردی چون طول کل، طول استاندارد، ارتفاع بدن، ضخامت بدن، دور سینه و طول سر بر حسب سانتیمتر انجام پذیرفت<sup>(۷)</sup>. سپس با اندازه‌گیری وزن میزان تزریق هورمون هیپوفیز براساس جدول علی اف تعیین شد و هر ۵ تا ۶ قطعه مولد نر و ماده به صورت جداگانه در حوضجه‌های خاکی ۸ متر مربعی قرار گرفتند<sup>(۸)</sup> و<sup>(۹)</sup> براساس کارهای دانشمندان روسی (Martyshov 1973) ضرب فولتون،

درصد ساختار فربه، نسبت ارتفاع، نسبت طول سر به طول استاندارد به دست آمد<sup>(۴)</sup>. در مرحله تکثیر مصنوعی بدلاً لیل مختلف از جمله جدا شدن پلاک مولدین و عدم پاسخ مثبت به تزریق هورمون و همچنین پرولاپس تخدمان (Prolapse) (این اصلاح در هنگامی که به علت دستکاری مولدین، منفذ تناسلی بسته شده یا تخدمان ماهی از منفذ تناسلی خارج می‌گردد و ماهی قادر به تخریزی نخواهد بود به کار می‌رود). مولدین ماده عملیات بر روی ۵۹ مولد ماده ادامه یافت. تلقیح مصنوعی به صورت بارور نمودن تخمها یک مولد ماده با اسپرم ۵ تا ۶ مولد نر به روش لقادیر خشک صورت گرفت<sup>(۱۰)</sup>.

در این مرحله با رسیدگی مولدین ماده در زمان مقرر با توزیع تخدمان، هم‌آوری کاری، هم‌آوری نسبی، تعداد تخم در هر گرم، قطر تخم، درصد لقادیر، تعداد تخمها لقادیر یافته، درصد تبدیل تخم به لارو و تعداد لاروهای حاصله با اندازه‌گیری گردید.

به منظور پرورش لاروهای ماده از ماهیان داشتاری با شماره‌های ۱ و ۲ و ۳ برای ارزیابی وضعیت بجهه ماهیان حاصله از مولدین ۵ و ۶ و ۷ ساله که در کشور مناسبت‌برین سن به نظر می‌رسند آماده‌سازی گردیدند. چون نتیجه حاصل

برای شناخت بهترین مولدین ماده کپور نقره‌ای بر روی ۱۸۶ مولد ماده، ریخت‌سنگی و اندازه‌گیری صفات تولید‌مثلی انجام شد. و از میان آنها ۹ مولد براساس ضرب چاقی جهت بررسیهای بعدی انتخاب شدند. پارامترهای اندازه‌گیری شده عبارت‌اند از: طول کل، طول استاندارد، وزن بدن، ضرب فولتون، ارتفاع بدن، نسبت فربه بدن، طول سر و سن. پس از تکثیر مصنوعی مولدین مشخصات تخمها و مراحل انکوباسیون شامل میزان باقیماندگی تخم در دوره انکوباسیون، وزن تخدمان، هم‌آوری کاری، هم‌آوری نسبی، درصد تخمها لقادیر یافته و لاروهای حاصل بررسی شدند. در مورد هر مولد ماده عملیات تکثیر مصنوعی به طور مجزا انجام گرفت. لاروهای حاصله در استخراهای خاکی جداگانه جهت تعیین کیفیت بجهه ماهیان تا مرحله انگشت قدر، پرورش داده شدند. با توجه به اطلاعات موجود مبنی بر مناسب بودن مولدین  $5^+$ ،  $6^+$  و  $7^+$  ساله بررسی روی این سه رده سنی که به ترتیب مولدین مربوطه ضرب فولتون معادل  $K = 2/2 < K < 2/2 >$  داشتند صورت گرفت. مولدین با ضرب فولتون بیشتر از  $2/2$  نسبت‌آز لاحاظ سلامتی و بقاء و سایر مواردی که در گزینش مولد ماده خوب در نظر گرفته می‌شود برتری داشتند. واژه‌های کلیدی: مولدین، کپور نقره‌ای، ضرب فولتون، تکثیر مصنوعی، اصلاح نژاد.

گزینش ابتدایی برای مولدی که تغذیه مناسب داشته است شامل سلامتی ظاهری، وجود تناسب بین قسمتهای بدن، پرگوشت بودن و کوچک بودن سر به طور نسبی است (Martyshov 1973). در انتخاب ماهی مولد مناسب فاکتورهای وجود دارد که ما در این گزینش باری می‌دهد، مانند هم‌آوری یعنی تعداد تخمی که از یک مولد به دست می‌آید<sup>(۱)</sup> به میزان بالا و مناسب، مقاومت در برابر شرایط محیط زیست و بیماریهای مختلف، درشت بودن تخم به دلیل شاخص مواد ذخیره‌ای کافی و لقادیر بالا نشانه تکامل جنسی کامل مولدین، رشد سریع و بلوغ زودرس از عواملی است که در گزینش یک مولد ماده مناسب باشیست مورد توجه قرار گیرد<sup>(۳)</sup>. اما یکی از فاکتورهای مهم براساس فنتوپ تطبیق نتایج کار حاصل از تجزیه شیمیایی با محاسبات انجام شده از طریق فرمول فولتون است<sup>(۹)</sup>. نظر به اینکه در ایران روش انتخاب ماهیان مولد به طور سنتی براساس مشخصات ظاهری صورت می‌گرفت و می‌باشد این کار به یک روش علمی تر تغییر یابد لذا روش‌های انتخاب مولدین بر روی گونه کپور نقره‌ای براساس الگویی از کارهای مارتیشو (Martyshov 1975) و سایر دانشمندان روسی در گونه کپور معمولی با مشخص نمودن سه عامل فاکتور کیفیت (Condition factor) (شاخصی است که میزان کیفیت و چاقی ماهی را نشان می‌دهد و به آن ضرب k، ضرب فولتون یا شاخص سنجش (Ponderal index) نیز می‌گویند که در استخراهای پرورشی از فرمول  $k = \frac{V}{d^3}$  محاسبه می‌گردد که  $V =$  وزن ماهی به گرم و  $d =$  طول استاندارد به سانتیمتر است<sup>(۳) و (۹)</sup> شاخص فربه (Body width) (شاخصی است که نسبت ضخامت بدن به طول ماهی را به درصد بیان می‌کند و از فرمول  $\frac{B}{d^2} =$  محاسبه می‌گردد  $B =$  ضخامت ماهی به سانتیمتر و  $d =$  طول استاندارد به سانتیمتر می‌باشد<sup>(۳) و (۹)</sup>، و نسبت

(۱) گروه آموزشی بهداشت و بیماریهای آبزیان دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران، تهران - ایران.

(۲) گروه آموزشی تدبیه و اصلاح نژاد دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران، تهران - ایران.

(۳) دانش آموخته رشته شیلات دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران، تهران - ایران.

\* این مقاله با استفاده از اعتبارات طرح تحقیقاتی ارزیابی ماهیان مولد گرامی (باتاکید بر گونه کپور نقره‌ای) برای اصلاح نژاد، مصوبه شورای پژوهشی دانشگاه تهران تهیه شده است.



### جدول ۱- مشخصات مولدین و فرزندان آنها در استخراشماره یک

تاریخ	۷۴/۴/۲۰	۷۴/۴/۱۹	۷۴/۴/۱۹
شماره پلاک	۹۲	۲۰۶	۲۱۶
سن (سال)	۵ <sup>+</sup>	۵ <sup>+</sup>	۵ <sup>+</sup>
وزن بدن (g)	۹۵۰۰	۸۰۰۰	۸۵۰۰
طول کل (cm)	۸۴	۸۲	۸۲
طول استاندارد (cm)	۷۴	۷۰/۵	۷۰
طول سر (cm)	۲۰/۵	۱۹/۵	۲۰
ارتفاع بدن (cm)	۲۲/۵	۲۲	۲۲
ضخامت بدن (cm)	۱۲/۵	۱۲/۵	۱۱
دور سینه (cm)	۵۴	۵۳	۵۴
k	۲/۳	۲/۳	۲/۴
نسبت سر (cm)	۰/۲۷	۰/۲۷	۰/۲۸
نسبت ارتفاع	۳/۳	۳/۲	۳/۲
شاخص فربه‌ی	۱۶/۹	۱۷/۷	۱۵/۷
وزن تخدمان (g)	۹۵۰	۵۰۰	۶۰۰
هم‌آوری نسبی	۴۲	۳۳	۵۸
تعداد تخم در هر گرم	۴۲۱	۵۳۱	۸۲۴
قطر تخم (mm)	۳/۹	۴/۱ الی ۲/۸	۴/۲ الی ۲/۱
هم‌آوری (عدد)	۳۹۹۹۵۰	۲۶۵۵۰۰	۴۹۴۴۰۰
درصد لقاد	% ۹۶	% ۹۹/۵	% ۹۲/۱
میزان تخم (عدد)	۳۸۳۹۵۲	۲۶۴۱۷۲	۴۵۵۳۴۳
درصد تبدیل به لارو	% ۵۶/۹	% ۲۲/۷	% ۲۳/۷
حجم لارو (cm <sup>3</sup> )	۹۱۰	۲۵۰	۴۵۰
تعداد لارو (به قطعه)	۲۱۸۴۰۰	۶۰۰۰۰۰	۱۰۸۰۰۰
حجم لارو ریخته شده در استخر (cm <sup>3</sup> )	۶۰۰۰	۲۵۰ <sup>CC</sup>	۴۵۰ <sup>CC</sup>
تعداد لارو موجود در استخر	۱۴۴۰۰۰	۶۰۰۰۰	۱۰۸۰۰۰

از این تحقیق تنها منجر به تعیین و معرفی سن مناسب مولدین این گونه در شرایط آب و هوایی موردنظر می‌گردید. بنابراین ضریب فولتون که از نظر علمی معترضت و محاسبه‌اش ساده‌تر بود مدنظر قرار گرفت. در شرایط موجود با توجه به وجود ۹ مولد ماده که در شرایط مساوی لاروهاشان آماده پرورش بودند، لاروهای هر ۳ مولد به یک استخراش معرفی شدند. بدین ترتیب استخراش‌های شماره ۱ و ۳ به ترتیب برای لارو مولدینی که ضریب فولتون (k) آنها بزرگتر از ۲/۲ (یعنی سن ۵<sup>+</sup>) کوچکتر از ۲ (یعنی سن ۴<sup>+</sup>) و بین ۲ تا ۲/۲ (یعنی سن ۴<sup>+</sup>) اختصاص داده شدند که در هر استخراش مطابق مشخصات جداول ۱ و ۲ و ۳ میزان ۳/۲ هزار قطعه لارو با متوسط طول ۷/۷ میلیمتر با شرایط پرورشی بکسان یک دوره پرورشی ۳۶ روزه راطی نمودند. در سن سی و شش روزگی، طول کل، وزن و درصد رشد نسبی و درصد لاروهای سالم اندازه‌گیری گردید تا این شاخصها برای ارزیابی مولدین ماده مورد استفاده قرار گیرند.

بررسی آماری نتایج بدست آمده با استفاده از روش آماری ANOVA یک طرفه انجام پذیرفت. پیش از انجام این روش آزمون همگنی واریانسها در مورد طول کل، طول استاندارد، ضریب فولتون، نسبت ارتفاع، شاخص فربه‌ی، هم‌آوری و مقدار تخمها لقادح یافته، مورد استفاده قرار گرفت. اختلاف میانگینها با آزمون توکی (Tukey) مورد تجزیه و تحلیل واقع شد (۵).

### نتایج

از تعداد ۵۹ قطعه مولد ماده‌ای که به تزریق هورمون پاسخ مثبت دادند، ۴ مولد به علت عدم شرایط، فقط تا مرحله هم‌آوری ارزیابی گردیدند. ۲۵ مولد تا مرحله چشم زدن تخمها و ۲۱ مولد تا مرحله لاروده‌ی رسیدند و ۹ مولد نیز لاروهاشان در استخراش‌های یک هکتاری پرورش داده شد. نتایج بدست آمده گویای این است که لاروهای مولدین با ضریب فولتون بالاتر از ۲/۲ از نظر هر ۴ جنبه مورد بررسی برتر بودند. این امر می‌تواند نشان دهنده برتری والدین آنها نیز باشد (تصویر ۱).

در استخراش شماره ۳۰، ۳۰ درصد بچه ماهیان حاصل شده از مولدین با  $K > 2/2$  یعنی تعداد حدود ۲۱۹۰۰ قطعه از ۷۳۰۰۰ قطعه ناقص‌الخلفه بودند. به طوری که در ساقه دمی این بچه ماهیان انحراف مشاهده گردید. ضمناً رابطه بین طول و وزن ماهیان مولد نر و ماده به صورت فرمول و نمودار ۲ و ۳ به دست آمد و مشخصات کل فاکتورهای ارزیابی شده مولدین ماده در جدول ۴ نشان داده شده است.



$K > 2/2$

۶۴/۸ سانتیمتر	حداقل طول بچه ماهی
۸ سانتیمتر	حداکثر طول بچه ماهی
۷۴/۴ سانتیمتر	متوسط طول بچه ماهی
۳ گرم	حداقل وزن بچه ماهی
۴/۴ گرم	حداکثر وزن بچه ماهی
۳/۷ گرم	متوسط وزن بچه ماهی

تصویر ۱- ماهی کپور نقره‌ای یافیتوفاگ (Hypophthalmichthys molitrix)



جدول ۳- مشخصات مولدین و فرزندان آنها در استخر شماره پنج

۷۴/۴/۱۹	۷۴/۴/۲۰	۷۴/۴/۲۰	تاریخ
۲۱۴	۳۱۲	۲۱۲	شماره پلاک
۷+	۷+	۷+	سن (سال)
۹۷۰۰	۷۵۰۰	۸۱۰۰	وزن بدن (g)
۸۷	۸۱	۸۴	طول کل (cm)
۷۵/۵	۷۰	۷۴	طول استاندارد (cm)
۱۹/۵	۱۹/۵	۱۹	طول سر (cm)
۲۴	۲۰	۲۲/۵	ارتفاع بدن (cm)
۱۳	۱۳	۱۳	ضخامت بدن (cm)
۵۷	۵۱	۵۳	دور سینه (cm)
۲/۲	۲/۲	۲	k
۰/۲۶	۰/۲۸	۰/۲۵	نسبت سر (cm)
۳/۱	۳/۵	۳/۳	نسبت ارتفاع
۱۷/۲	۱۸/۵	۱۷/۵	شاخص فربهی
۸۵۰	۹۵۰	۱۰۰	وزن تخدمان (g)
۵۱	۷۳	۹	هم آوری نسبی
۵۸۲	۵۷۸	۷۲۸	تعداد تخم در هر گرم
۳/۵ الی ۱/۱	۳/۵ الی ۱/۱	۴/۵	قطر تخم (mm)
۴۹۴۷۰۰	۵۴۹۱۰۰	۷۲۸۰۰	هم آوری (عدد)
% ۱۰۰	% ۹۸/۵	% ۱۰۰	درصد لفاح
۴۹۴۷۰۰	۵۴۰۸۶۴	۷۲۸۰۰	میزان تخم (عدد)
% ۵۰/۹	% ۶۶/۵	% ۶۵/۹	درصد تبدیل به لارو
۱۰۵۰	۱۵۰۰	۲۰۰	حجم لارو (cm³)
۲۵۲۰۰۰	۳۶۰۰۰۰	۴۸۰۰۰	تعداد لارو (به قطعه)
۷۰۰cc	۴۰۰cc	۲۰۰cc	حجم لارو ریخته شده در استخر (cm³)
۱۶۸۰۰۰	۹۶۰۰۰	۴۸۰۰۰	تعداد لارو موجود در استخر

جدول ۲- مشخصات مولدین و فرزندان آنها در استخر شماره سه

۷۴/۴/۱۹	۷۴/۴/۱۹	۷۴/۴/۲۰	تاریخ
۲۱۶	۲۰۶	۹۲	شماره پلاک
۶+	۶+	۶+	سن (سال)
۸۰۰۰	۸۰۰۰	۹۵۰۰	وزن بدن (g)
۸۷	۸۵	۹۳	طول کل (cm)
۷۴	۷۴	۸۰	طول استاندارد (cm)
۱۸	۱۸	۲۰	طول سر (cm)
۲۱/۵	۲۲	۲۱	ارتفاع بدن (cm)
۱۱	۱۱/۵	۱۴	ضخامت بدن (cm)
۵۲	۵۳	۵۳	دور سینه (cm)
۱/۹	۱/۹	۱/۸	k
۰/۲۴	۰/۲۴	۰/۲۵	نسبت سر (cm)
۳/۴	۳/۳	۳/۸	نسبت ارتفاع
۱۴/۸	۱۵/۵	۱۷/۵	شاخص فربهی
۷۵۰	۱۱۰۰	۹۵۰	وزن تخدمان (g)
۶۶	۷۱	۵۹	هم آوری نسبی
۷۰۱	۴۹۶	۵۹۳	تعداد تخم در هر گرم
۴/۵ الی ۲/۹	۴/۵ الی ۲/۹	۴/۵ الی ۲/۹	قطر تخم (mm)
۵۲۵۷۵۰	۵۷۰۴۰۰	۵۶۳۳۵۰	هم آوری (عدد)
% ۸۷/۵	% ۹۸/۶	% ۹۸/۹	درصد لفاح
۴۶۵۲۸۸	۵۶۲۴۱۴	۵۵۷۱۵۴	میزان تخم (عدد)
% ۱۲/۹	% ۲۷/۷	% ۲۸	درصد تبدیل به لارو
۲۵۰	۶۵۰	۶۵۰	حجم لارو (cm³)
۶۰۰۰۰	۱۵۶۰۰۰	۱۵۶۰۰۰	تعداد لارو (به قطعه)
۲۵۰cc	۴۵۰cc	۶۰۰cc	حجم لارو ریخته شده در استخر (cm³)
۶۰۰۰۰	۱۰۸۰۰۰	۱۴۴۰۰۰	تعداد لارو موجود در استخر

 $2 < K < 2/2$ 

۳/۶ سانتیمتر	حداقل طول بچه ماهی
۷/۲ سانتیمتر	حداکثر طول بچه ماهی
۵/۶ سانتیمتر	متوسط طول بچه ماهی
۱ گرم	حداقل وزن بچه ماهی
۳/۷ گرم	حداکثر وزن بچه ماهی
۲/۰۸ گرم	متوسط وزن بچه ماهی


 $K < 2$ 

۴/۳ سانتیمتر	حداقل طول بچه ماهی
۷/۹ سانتیمتر	حداکثر طول بچه ماهی
۶/۵۸ سانتیمتر	متوسط طول بچه ماهی
۱/۳ گرم	حداقل وزن بچه ماهی
۴/۴ گرم	حداکثر وزن بچه ماهی
۳/۰۴ گرم	متوسط وزن بچه ماهی




جدول ۴- مشخصات کلی فاکتورهای مورد ارزیابی در مولدین کپور نقره‌ای ماده ایرانی (داخلی)

نام متغیر	تعداد	حداکثر	حداقل	انحراف معیار	میانگین
وزن بدن (g)	۱۷۲	۱۳۸۰۰	۵۰۰۰	۱۶۴۹/۶۰	۸۱۵۶/۹۸
ضخامت بدن (cm)	۱۷۹	۱۵/۰	۷/۰	۱/۲۰	۱۱/۶۵
طول کل (cm)	۱۶۵	۹۴/۵	۶۸/۰	۵/۳۶	۸۲/۳۵
طول استاندارد (cm)	۱۶۵	۸۴/۵	۵۱/۰	۵/۰۳	۷۲/۰۶
طول سر (cm)	۱۶۵	۲۲/۰	۱۱/۰	۲/۰۱	۱۷/۹۲
درصد شاخص فربه‌ی	۱۶۵	۲۲/۴	۱۱/۷	۱/۰۴	۱۶/۲۰
ارتفاع بدن (cm)	۱۷۹	۲۸/۰	۱۸/۰	۱/۶۵	۲۱/۴۱
دور سینه (cm)	۹۰	۶۱/۰	۴۵/۰	۲/۹۸	۵۲/۳۴
نسبت سر	۱۶۵	۰/۳۰	۰/۱۶	۰/۰۲	۰/۲۵
ضریب فولتون	۱۵۷	۴/۰	۱/۵	۰/۳۰	۲/۱۵
نسبت ارتفاع	۱۶۵	۴/۰	۲/۴	۰/۲۵	۳/۳۵
سن (به سال)	۵۹	۹	۴	۱/۰۹	۵/۶۴
وزن تخدمان (g)	۵۴	۲۱۵۰	۲۰	۴۶۰/۰۵	۷۱۶/۸۵
حجم تخدمان (cm³)	۶۶	۱۷۰۰	۲۰	۴۱۱/۹۴	۷۳۱/۳۶
تعداد تخم در هر گرم	۵۸	۸۷۶	۴۰۰	۱۳۰/۹۰	۶۰۶/۵۷
حداکثر قطر تخم (mm)	۲۸	۶/۰	۲/۱	۱/۲۸	۳/۲۸
حداکثر قطر تخم (mm)	۲۸	۶/۰	۳/۵	۰/۰۹	۴/۳۸
هم‌آوری کاری	۵۸	۸۰۹۶۰۰	۱۰۱۸۰	۲۱۱۴۸۰/۰۳	۴۰۰۷۶۶/۰۵
هم‌آوری نسبی	۵۸	۹۴	۱	۲۴/۴۰	۴۷/۰۳
درصد لفاح	۴۶	۱۰۰/۰	۴/۵	۱/۷۰	۹۰/۸۱
تعداد تخمهای لفاح یافته	۴۶	۸۰۳۰۷۵	۴۲۸۶	۲۰۶۶۸۵/۳۰	۳۸۱۸۹۱/۰۲
درصد تفريح	۲۱	۶۸/۱	۴/۳	۱۹/۲۷	۳۰/۳۸
تعداد کل لارو حاصله از هر مولد	۲۱	۴۸۰۰۰۰	۱۲۰۰۰	۱۱۶۱۱۶/۶۵	۱۴۰۸۵۷/۱۴



نمودار ۱- نمودار دایره‌ای درصد رشد نسبی، درصد بقاء تعداد بجهه‌ماهی حاصله و تولید گرم بر هکتار در سه استخر پرورشی براساس ضریب فولتون






متغیر	واحد	حداقل	حداکثر	میانگین	انحراف معیار	خطای معیار	ضریب تغییر
طول (Length)	میلیمتر (mm)	۶۰۰/۰۰	۸۸۰/۰۰	۷۲۰/۳۳	۶۹/۵۰	۸/۹۷	۰/۰۹۷
وزن (Weight)	گرم	۴۵۰۰/۰۰	۱۳۵۰۰/۰۰	۷۵۶۶/۶۷	۱۹۸۱/۶۷	۲۵۵/۸۳	۰/۲۶۲

نمودار ۲ - رابطه طول - وزن در بین مولدین نر ایرانی





متغير	واحد	حداقل	حداکثر	میانگین	انحراف معیار	خطای معیار	ضریب تغییر
طول (Length)	میلیمتر (mm)	۵۷۵/۰۰	۸۳۰/۰۰	۷۲۹/۹۰	۴۹/۲۲	۶/۸۹	۰/۰۶۷
وزن (Weight)	گرم	۶۲۰۰/۰۰	۱۳۰۰۰/۰۰	۸۳۸۶/۲۷	۱۴۳۰/۸۱	۲۰۰/۳۵	۰/۱۷۱

نمودار ۳ - رابطه طول - وزن در بین مولدین ماده مناسب ایرانی



جدول ۵- مقایسه میانگینهای ( $Mean \pm SE$ ) گروههای سه گانه ماهیان مولد ماده کپور نقره‌ای برای پارامترهای مختلف زیست‌سنگی

تخم لفاح یافته	هم‌آوری	شاخص فربه‌ی	نسبت ارتفاع	ضریب فولتون	طول استاندارد	طول کل	گروهها	مولدهای ماده
۳۶۱۹۶۰/۹ $\pm$ ۷۳۲۶۸/۴۶۶	۳۷۸۱۶۸۷ $\pm$ ۷۶۸۵۵/۵۶۶	۱۶/۸ $\pm$ ۰/۴ a	۲/۲ $\pm$ ۰/۰۳۱ a	۲/۴ $\pm$ ۰/۰۴۸ a	۷۰/۴ $\pm$ ۱/۶۴ a	۸۱/۱ $\pm$ ۱/۷۹ a	گروه ۱	K > 2,2
۵۶۳۰/۷۵ $\pm$ ۳۸۰۲۵/۵۶۶	۵۷۷۱۶۰ $\pm$ ۷۶۸۵۵/۵۶۶	۱۵/۸ $\pm$ ۰/۲۷ b	۳/۵ $\pm$ ۰/۰۵۳ b	۱/۸ $\pm$ ۰/۰۲۷ b	۷۶ $\pm$ ۱/۰۶ b	۸۷ $\pm$ ۱/۰۶ b	گروه ۲	K < 2
۳۶۶۲۶۳/۱۴ $\pm$ ۴۲۸۴۴/۷۶۶	۴۰۵۸۷۳/۸ $\pm$ ۴۶۷۶/۱۲۶	۱۶/۸ $\pm$ ۰/۲۳ c	۲/۳ $\pm$ ۰/۰۳۹ c	۲/۱ $\pm$ ۰/۰۱۹ c	۷۲/۴ $\pm$ ۰/۸۷ab	۸۳/۹ $\pm$ ۰/۹۳ab	گروه ۳	2 < K < 2,2

\* اعدادی که با حروف لاتین مشترک شده‌اند با یکدیگر اختلاف معنی‌داری ندارند ( $P < 0.05$ ).

### بحث

همکاریهای صمیمانه و همچنین کلیه کارکنان زحمتکش مجتمع دامپوری و پرورش ماهی سفیدرود قدردانی و تشکر می‌نماییم.

### منابع

۱. آذری تاکامی، ق. تعیین هم‌آوری ماهی سفید، نامه دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران، ۳۵ (۱ و ۲): صص ۶۹ - ۶۶ (۱۳۵۸).
۲. آذری تاکامی، ق. اصول تکثیر و پرورش ماهی، انتشارات روابط عمومی وزارت کشاورزی - آذربایجان شیلات ایران، شماره ۱۵۴ / ۱۵۲، ۶۴ - ۶۲ صفحه. (۱۳۶۳).
۳. آذری تاکامی، ق. روش‌های ارزیابی مولدهای ماهیان گرمایی، تخصصیات تكمیلی دانشکده‌های دامپزشکی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، ص. ۲۵، (۱۳۷۳).
۴. تاو، د. مبانی زنگنه و اصلاح نژاد ماهیان، ترجمه دکتر فرهاد امینی، انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، ۳۳۴ صفحه. (۱۳۷۴).
۵. دانیل، واين. و اصول و روش‌های آمار زیستی، ترجمه دکتر سید محمد تقی آیت‌الله، انتشارات مؤسسه امیر کبیر، (۱۳۶۸).
۶. عوادلی، الف. ارزیابی ماهیان مولد گرمایی (با تاکید بر گونه کپور نقره‌ای) برای اصلاح نژاد، پایان نامه کارشناسی ارشد رشته شیلات دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران، (۱۳۷۵).
7. Biswas, S.P. "Manual of methods in fish biology." South Asian publisher Ltd. pp. 22, 23, 52 - 64, 81 , 84 - 91 , 100, (1993).
8. Huet, M. Text book of fish culture. Fishing News Books. pp. 116, (1972).
9. Martyshev, F. G. Pond fisheries Amerind Publishing Co. put. Ltd. pp. 42 - 69, 395 - 429, (1973).
10. Pillay, T. U. R.; Aquaculture (principles and practices) Fishing News Books. pp. 161 - 166 - 294, (1990).
11. Tave, D. Genetics for fish hatchery managers. Chapman & Hall. pp. 130 - 147, 150 , 180 , 187, (1986).
12. Venkataramanujam. K. and N. Ramathan, Manual of finfish biology Oxford & LBH publishing. pp. 19 - 21, 38, 44, (1994).

جدول ۵ مقایسه میانگینهای گروههای سه گانه مولدهای ماده را برای پارامترهای مختلف زیست‌سنگی نشان می‌دهد. با توجه به نتایج نشان داده شده هر یک از نمودارهای دایره‌ای چنین برداشت می‌گردد که بجهه ماهیان حاصل از مولدهای با ضریب فولتون یا K بالای ۲/۲ برتری و اختلاف فاحشی از نظر رشد و بقاء با دو گروه دیگر دارند پس می‌توان گفت مولدهای با هم‌آوری کمتر دارای لارو و بجهه ماهیان مقاومتی خواهند بود و مولدهای با سن + ۵ کمتر دارند می‌توانند بمعناون مولدهای برتر تلقی گردند. از آنجاکه برای بهگزینی مولدهای از روش‌های دقیق‌تری چون شاخص بهگزینی برای مولدهای با سنین مشخص می‌توان ببره گرفت اما چون انجام این آزمایشها زمان بر است و امكان تلف شدن ماهی را به همراه دارد نتایج حاضر می‌تواند برای تکمیل بررسیهای دیگر مورد استفاده قرار گیرد (۴). با به کارگیری نتایج این تحقیق می‌توان از مولدهای گزینش شده به منظور سرافجویی در مصرف هیپوفیز، زمان، نیروی انسانی و هزینه‌ها استفاده نمود ضمن اینکه برای گزینش مولدهای ماده همچنین باید به خصوصیات ظاهری مولد از جمله سلامتی ظاهری، کوچک بودن سر، تناسب اندام و غیره توجه نمود. عامل مهمتر از گزینش مولده مناسب، مدیریت صحیح تکثیر و نگهداری مولدهای با همراه دقت عمل در موارد جزیی مانند جابه‌جایی مولدهای مولدهای انتقال تخم به انکوباتور وغیره می‌تواند بعده بیرون زدنگی مجاری تخدمان مولدهای را نیز حل نمود و از تأثیر سوء محیطی بر روی تبدیل تخمها چشم زده به لارونیز کاست (۱). قابل ذکر آنکه در شناسایی گونه خالص کپور نقره‌ای از دو رگه‌های آن در شرایط کشور باید به کوچک بودن سر، ترسیدن انتهای باله سینه‌ای به شکمی و داشتن کیل سینه‌ای کامل توجه داشت (۱۲).

برای کسب نتایج جامع تر نیاز به تحقیقات در سطحی وسیعتر با امکانات بیشتری می‌باشد. و همچنین با ارزیابی مولدهای جنس نر کارایی مطمئن‌تر و با صرفه‌تری بیش رو خواهد بود. برنامه‌ریزی بهگزینی و ارزیابی می‌تواند با تعیین و راثت‌پذیری و تعیین فرمول شاخص بهگزینی و انجام مولده‌سازی با روش‌های علمی اصلاح نژاد با انتخاب ۵ درصد از بجهه ماهیان زیر بکمال و نگهداری آنها و سپس انتخاب ۱۰ درصد آنها در سال دوم و سپس گزینش ۲۵ درصد از بین بالغین سال سوم انجام گیرد (۳ و ۴). همچنین با تأسیس مزارع نمونه مولده‌سازی و مراکز تحقیقات زنگنه و اصلاح نژاد ماهیان از واردات مولدهای و زوال نسل مولدهای حاضر می‌توان جلوگیری کرد.

### تشکر و قدردانی

در پایان از جناب آقای مهندس مصطفی گشايشی مدیر عامل محترم شرکت سهامی سفیدرود و آقای دکتر محمد شنوا رئوف ریس مجتمع تکثیر و پرورش ماهی و جناب آقای مهندس مهران بزرگی فر به خاطر کمکهای بی‌دریغ و



## Estimation of female Silver carp broodstocks "Hypophthalmichthys molitrix" for selection breeding

Azari Takami, G.<sup>1</sup>, Shahidi, R.<sup>2</sup>, Adeli, A.<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Department of Aquatic Animal Health, Faculty of Veterinary Medicine, Tehran University, Tehran - Iran. <sup>2</sup>Department of Animal Nutrition & Breeding Faculty of Veterinary Medicine, Tehran, University , Tehran - Iran. <sup>3</sup>Graduated in Faculty of Natural Resources Fisheries and Environment sector. Tehran University , Karaj - Iran.

In order to estimation of best broodstocks of Silver carp for selection breeding, biometry and reproductive measurement were conducted on 186 of females spawners. Amongst it, 9 spawners were selected for next studies. The measured parameters were contained such as total length, standard length, body weight, Fulton's index, body height and ratio of thickness , length of head and age. After artificial insemination of broodstocks, the characteristics of eggs and incubation phases, the ovary weight. working and relation fecundity the number of hatched eggs and resulted larvae were studied. Each spawners were separately expended all stages of artificial propagation. For measuring the condition factor of fingerlings the resulted larvae had grown in separate earthen ponds. In attention to available data for favourable spawners in the ages of  $5^+$  ,  $6^+$  ,  $7^+$  the survey was conducted on these 3 age categories which respectively had a Fulton's index of  $k < 2.2$  ,  $k < 2$  ,  $2 < K < 2.2$  . The spawners with Fulton's index more than 2.2 had preference in healthy and survival rate and other factors which ordinally is selected for good female spawners.

**Key words :** Spawners, Silver carp, Fulton's index, Selection Artificial propagation.

