

مطالعه گذشته نگار ارزش رادیوگرافی در تشخیص عوارض و بیماریهای تک سمیها

دکتر سارنگ سرووری^{*} دکتر محمد مهدی دهقان^۱ دکتر افشن رئوفی^۱ دکتر علی اشرفی^۲

دریافت مقاله: ۲۷ اردیبهشت ماه ۱۳۸۳

پذیرش نهایی: ۱۰ اسفند ماه ۱۳۸۳

هدف: تعیین فراوانی عوارض و بیماریهای مختلف تک سمی‌های ارجاعی به بخش رادیولوژی بیمارستان تخصصی دامپزشکی شهرکیان و تاثیر عوامل نژاد، سن و جنس دام بر میزان وقوع این عوارض و بیماریها.

طرح: مطالعه گذشته نگر.

حیوانات: تعداد ۳۲ راس اسب، ۷ راس الاغ و ۵ راس قاطر ارجاعی به بخش رادیولوژی.
روش: تعداد ۱۰۷ رادیوگراف مربوط به تک‌سمی‌های (۷۵ مورد اسب، ۱۷ مورد الاغ و ۱۵ مورد قاطر) ارجاعی به بخش رادیولوژی بیمارستان مربوط به یک دوره ۴ ساله (از خرداد سال ۱۳۷۷ تا مرداد ماه ۱۳۸۱) مورد مطالعه و ارزیابی گذشته نگر قرار گرفت. رادیوگرافها از نظر عارض موجود و اثر عوامل نژاد، سن، جنس و محل عارضه مورد بررسی قرار گرفتند و اطلاعات در جداول خاصی به تفکیک فراوانی بیماری، سن، جنس، نژاد و محل عارضه درج گردید.

نتایج: بیماریها و عواض مشاهده شده شامل شکستگی‌ها، برآمدگی‌های استخوانی (Exostosis)، عفونت استخوانی (استتوومیلت)، استتوآرتروز، آرتربیت، سندروم ناویکولار، پنومونی، هیپرواسکولاریزاسیون ریوی، تورم بافت نرم، لامینایتیس، بیماری جیوب حلقی، آبسه و کلسیفیکاسیون بودند. شایع ترین عوارض مشاهده شده در اسبهای ارجاعی شکستگی و برآمدگی‌های استخوانی هر یک به میزان ۱۸/۱۸ درصد بودند. بیشترین عوارض در ناحیه بندهای انگشت در اسب ۳۱/۲۵ درصد تشخیص داده شد. از میان عوارض اسکلتی و مفصلی در اسب، برآمدگی‌های استخوانی با فراوانی ۲۵ درصد و شکستگی کامل از نوع خردشده با فراوانی ۱۸/۷۵ درصد به ترتیب رتبه‌های اول و دوم را دارا بودند. در الاغ شکستگی و بیماری جیوب حلقی با فراوانی یکسان ۲۵ درصد و در قاطر نیز سه عارضه شکستگی (۶۰ درصد)، برآمدگی‌های استخوانی (۲۰ درصد) و تورم بافت نرم (۲۰ درصد) مشاهده شد.

نتیجه‌گیری: این مطالعه قابلیت‌های رادیوگرافی را در تشخیص عوارض و بیماریهای مختلف و همچنین درصد احتمال وقوع آنها را براساس تاثیر عوامل جنس، نژاد، سن و محل عارضه در نواحی مختلف بدن تک‌سمی‌ها در محل مورد مطالعه نشان می‌دهد. مجله دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران، ۱۳۸۴، دوره ۶، شماره ۳۶۱، ۳۵۷-۳۶۱.

واژه‌های کلیدی: رادیوگرافی- تک‌سمی- بیماریها.

با توجه به اینکه اطلاعات ثبت شده رادیوگرافی همیشه به عنوان سابقه‌ای با ارزش در مطالعات اپیدمیولوژی مورد استفاده قرار می‌گیرند می‌توان با استفاده از این یافته‌هادر باره پیش آگهی یک عارضه یا بیماری و همچنین بیماران ارجاعی بعدی اظهار نظر نمود و به نتیجه گیری آماری رسید. با توجه به ارائه خدمات

(۱) گروه علوم درمانگاهی دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران، تهران- ایران.

(۲) دامپزشک بخش خصوصی.

(*) نویسنده مسؤول: soroori@ut.ac.ir

Retrospective Study of Radiography in Diagnosis of Diseases and Disorders in Equidae

Soroori, S.¹, Dehghan, M. M.¹, Raoofi, A.¹, Ashrafi, A².

¹Department of Clinical Sciences, Faculty of Veterinary Medicine, University of Tehran, Tehran-Iran. ²Private Veterinarian.

Objective: To determine the frequency of diagnosed disorders or anomalies in different organs and systems and also effects of breed, age and sex on their incidence rate.

Design: Retrospective study.

Animals: 32 horses, 7 donkeys and 5 mules referred to the radiology division.

Procedure: Data were collected from 107 equidae radiographs which had been taken in the Department of Radiology University of Tehran during 4- years (1998-2001). Radiographs were evaluated for finding injuries and showing relation of disease with breed, sex, age and site of injuries. Information was gathered in the specific charts for determining of frequency of each condition.

Results: Diseases and disorders were fractures, exostosis, osteomyelitis, osteoarthritis, arthritis, navicular syndrome, pneumonia, pulmonary hypervascularization, soft tissue swelling, laminitis, guttural pouches disease, abscess and calcification. Fractures (18.18%) and exostosis (18.18%) had the highest frequency in horses. The most frequent disorders were diagnosed in phalangeal area of horse (31.25%). Furthermore, the first and second most frequent bone disorders in horses were exostosis (25%) and comminuted fracture (18.75%). Fractures and guttural pouches disease were seen with equal frequency (25%). In mule, fractures (60%), exostosis (20%) and soft tissue swelling (20%) were diagnosed.

Clinical implication: This study showed that radiography is a valuable method for diagnosing of equidae disordered organs and systems (in relation with factors such as sex, breed, age and site) and also their frequency.

J.Fac.Vet.Med.Univ.Tehran. 60,4:357-361,2005.

Keywords: radiography, equine, retrospective study.

Corresponding author's email: soroori@ut.ac.ir

رادیولوژی در بیمارستان تخصصی دامپزشکی شهرکیان در خصوص دامهای بزرگ در طی سالهای گذشته، یافته‌هایی به دست آمده از بایگانی بخش رادیولوژی می‌تواند اطلاعات ارزشمندی را در اختیار علاقمندان و سایر همکاران و محققین قرار دهد. این بررسی با هدف دست یابی به اطلاعات زیر دنبال شد: ۱-



"رادیوگرافی NSAD=No Significant Abnormality Detected" داده شد بدان معنا که نشانه رادیوگرافی غیرعادی مشاهده نشده است و درسه مورد نیز رادیوگرافهای تهیه شده فاقد معیارهای تشخیصی کافی از لحاظ شرایط اشعه بکار گرفته شده بودند.

با توجه به نتایج حاصل از بررسی رادیوگرافهای تهیه شده از اسbehا، شکستگی ها با تعداد ۴ مورد (۱۱/۴۳ درصد) و برآمدگیهای استخوانی (Exostosis) با تعداد ۴ مورد (۱۱/۴۳ درصد) فراوانترین عوارض تشخیص داده شده بودند و به دنبال آنها استئوارتروز، استئوارتریت، تورم بافت‌های نرم و لامیناتیس هر کدام با تعداد ۲ مورد (۷/۱۱ درصد) قرار داشتند. بیماری ناویکولار، آبسه، کلسیفیکاسیون، پنومونی، الگوی هیپرواسکولاریزاسیون ریوی و بیماری جیوب حلقی هر کدام بایک مورد (۲/۸۶ درصد) در رتبه بعدی قرار داشتند. ضمناً در ۱۰ مورد (۵/۵۷ درصد) نشانه غیرطبیعی رادیوگرافی مشاهده نشد (NSAD) و درسه مورد (۸/۵۷ درصد) کیفیت رادیوگرافهای تهیه شده برای تشخیص نامناسب بود.

در خصوص ارتباط بین محل عارضه و فراوانی مواد تشخیصی، اطلاعات بدست آمده نشان داد که عوارض ناحیه‌بندهای انگشت جمعاً ۱۵ مورد (۲۵/۳۱ درصد)، شامل برآمدگیهای استخوانی در سطوح مختلف بندهای انگشت (۴ مورد) و بیماری ناویکولار (۱ مورد) بیشترین فراوانی را دارا بودند. عوارض مفصل کارپ در ۴ مورد (۲۵ درصد)، شامل استئوارتروز و استئوارتریت (هر کدام ۲ مورد) تشخیص داده شد. عوارض نواحی متاتارس در ۳ مورد (۷۵/۱۸ درصد)، شامل تورم بافت‌های نرم ناحیه (۲ مورد) و شکستگی کامل از نوع خردشده (Comminuted) (۱ مورد) تشخیص داده شد. همچنین شکستگی کامل از نوع خردشده در نواحی استخوان ران و متاتارپ (هر کدام ۱ مورد) و شکستگی از نوع سالتر-هاریس تیپ II (۱ مورد) و آبسه کف سم (۱ مورد) از نظر فراوانی در رتبه بعدی قرار داشتند. فراوانی عوارض تشخیص داده شده به تفکیک سن، جنس و نژاد اسبهای مورد بررسی در جداول ۱، ۲ و ۳ آمده است. علاوه بر این فراوانی عوارض تشخیص داده شده به تفکیک سن، جنس و محل عارضه در قاطرها و الاغ‌های مورد بررسی به ترتیب در جداول ۴ و ۵ آورده شده است.

بحث

طبق جدول اشکستگی‌ها و برآمدگیهای استخوانی هریک با میزان ۱۱/۴۳ درصد را دارای بالاترین فراوانی درین بیماریهای مختلف اسب بودند. با اینکه شکستگی‌ها در اسب در تمام سنین رخ می‌دهد (۵)، ولی در بررسی حاضر تمامی موارد شکستگی در اسبهای نابالغ بوده است. علت این موضوع می‌تواند ناشی از پیش آگهی ضعیف تر شکستگی‌ها در اسبهای بالغ نسبت به کره اسبها باشد (۵) که سبب عدم ارجاع دامهای بالغ مبتلا به مراکز درمانی می‌گردد. شکستگی استخوانهای متاتارپ و متاتارس در اسب نسبتاً شایع می‌باشد (۷) که در این بررسی نیز ۵۰ درصد از موارد شکستگی در استخوانهای مذکور تشخیص داده شده است، از طرفی در کره اسبها شکستگی‌ها در صفحه رشد (fractures) (Physeal) بالایی استخوان زند اعلی مشاهده گردیده است (۱۰) که با نتایج به

به دست آوردن اطلاعات لازم از موارد ارجاعی و همچنین بیماریهای تشخیص داده شده در بخش رادیولوژی به صورت کامپیوتی تا در اسرع وقت بتوان سابقه و تاریخچه بیمار و بیماری را پیگیری کرد. ۲- استفاده از اطلاعات فوق در برنامه‌های آموزشی و تحقیقاتی. ۳- استفاده از این اطلاعات در مطالعات اپیدمیولوژیک. ۴- مقایسه آماری اطلاعات به دست آمده با مطالعات سایر محققین.

مواد و روش کار

مطالعه حاضر بر اساس کلیشه‌های رادیوگرافی و پروندهای درمانگاهی موارد ارجاعی به بیمارستان دام‌های بزرگ شهر کیان از آغاز ارائه خدمات بخش رادیولوژی صورت گرفته است. در این راستا اطلاعات موجود از نظر محل عرضه، حالت گماری، نژاد، سن و جنس دام و تاثیر این عوامل بر میزان فراوانی عوارض و بیماریهای متفاوت جمع آوری و ثبت شد. تمامی رادیوگرافها از خرداد سال ۱۳۷۷ تا مرداد سال ۱۳۸۱ توسط دستگاه رادیولوژی SHIMASZU که ماکریم و لتاژ ایجاد شده در سرلوه مولد آن ۱۲۵ کیلوولت وحداً کثیر شدت جریان ایجاد شده در لوله مولد ۶۰ میلی آمپر می‌باشد، تهیه و مورد ارزیابی قرار گرفتند. در بررسی انجام شده شاخصهای زیر مورد مطالعه قرار گرفتند:

۱- محل عارضه: محل عارضه با بررسی مستقیم رادیوگرافها و مطابقت آن با تشخیص بخش رادیولوژی تعیین گردید و در موارد طبیعی و غیرقابل تشخیص با عنوان مرکریت تابش اشعه گزارش گردید.

۲- حالت گماری: در اغلب موارد حالت گماری رادیوگرافی در فرم درخواست ثبت شده بود ولی در موارد لزوم حالت گماری از روی رادیوگرافها تعیین شد.

۳- نژاد: در این خصوص در مورد اسب نژادهای عرب، تروربد، دوخون (عرب×تروربد)، ترکمن و در چند مورد نامشخص ثبت گردید.

۴- سن: به علت عدم اطلاع صاحب دام در اغلب پرونده‌ها سن دقیق ثبت نشده بود. در چندین مواردی از روی نشانه‌های رادیوگرافی تعیین بالغ و نابالغ انجام گردید. معیار بلوغ جسمی در تک سمی ها ۵/۳ سالگی در نظر گرفته شد.

۵- جنس: ضمن ثبت جنس دام از روی پرونده در مواردیکه جنس دام ذکر نشده بود، جنس نامشخص گزارش شد.

۶- تشخیص رادیوگرافی: اغلب پرونده‌ها و اجد فرم درخواست رادیوگرافی بودند که در این فرم‌ها تشخیص رادیوگرافی نیز ثبت شده بود. ولی در صورت لزوم با بررسی مجدد تک تک و دقیق رادیوگرافها، تشخیص لازم داده شد. در نهایت جداول فراوانی بیماریها و عوارض مختلف در خصوص نژاد، سن و جنس، طراحی و تکمیل گردید.

نتایج

جمعاً تعداد ۴۴ راس تک سمی شامل ۳۲ راس اسب، ۷ راس الاغ و ۵ راس قاطرداری پرونده رادیوگرافی در سالهای فوق الذکر بودند که ۱۰۷ عدد رادیوگراف مربوطه مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفتند. از مجموع ۱۰۷ رادیوگراف مربوط به ۴۴ راس تک سمی بررسی شده، در ۱۱ مورد تشخیص رادیوگرافی "عدم وجود نشانه



جدول ۱- فراوانی عوارض تشخیصی بر حسب سن در اسbehای مورد بررسی.

درصد	تعداد	بیماری جیوب حلقی	بیماری لامینایتیس	تورم نرم	بافت‌های واسکولار- یزاسینون‌ریوی	الگوی هیپر- پنومونی	کلسفیکاپسیون	آبشه	بیماری ناویکولار	برآمدگیهای ناحیه انگشتان	استئوارتریت	استئوارتروز	استئوارتریت	شکستگی	عوارض تشخیصی سن
۴۰/۹۱	۹	-	-	۱	۱	۱	-	-	-	۲	-	-	-	۴	نابالغ
-	-	-	-	۱۱/۱۱	۱۱/۱۱	۱۱/۱۱	-	-	-	۲۲/۲۱	-	-	-	۴۴/۴۴	درصد
۵۹/۹	۱۳	۱	۲	۱	-	-	۱	۱	۱	۲	۲	۲	-	بالغ	
۱۰۰	-	۷/۶۹	۱۵/۳۸	۷/۶۹	-	-	۷/۶۹	۷/۶۹	۷/۶۹	۱۵/۳۸	۱۵/۳۸	۱۵/۳۸	-	درصد	

جدول ۲- فراوانی عوارض تشخیصی بر حسب جنس در اسbehای مورد بررسی.

درصد	تعداد	بیماری جیوب حلقی	بیماری لامینایتیس	تورم نرم	بافت‌های واسکولار- یزاسینون‌ریوی	الگوی هیپر- پنومونی	کلسفیکاپسیون	آبشه	بیماری ناویکولار	برآمدگیهای ناحیه انگشتان	استئوارتریت	استئوارتروز	استئوارتریت	شکستگی	عوارض تشخیصی جنس
۴/۵۵	۱	-	-	۱	-	-	-	-	-	۲	-	-	-	-	نر
-	-	-	-	۱۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	درصد
۶۲/۶۴	۱۴	-	-	۱	۱	۱	۱	-	-	۴	۲	-	-	۴	ماده
-	-	-	-	۷/۱۴	۷/۱۴	۷/۱۴	۷/۱۴	-	-	۲۸/۵۷	۱۴/۲۹	-	-	۲۸/۵۷	درصد
۳۱/۸۲	۷	۱	۲	-	-	-	-	-	-	۱	۱	-	-	۲	نامشخص
۱۰۰	-	۱۴/۲۹	۲۸/۵۷	-	-	-	-	-	-	۱۴/۲۹	۱۴/۲۹	-	-	۲۸/۵۷	درصد

جدول ۳- فراوانی عوارض تشخیصی بر حسب نژاد در اسbehای مورد بررسی.

درصد	تعداد	بیماری جیوب حلقی	بیماری لامینایتیس	تورم نرم	بافت‌های واسکولار- یزاسینون‌ریوی	الگوی هیپر- پنومونی	کلسفیکاپسیون	آبشه	بیماری ناویکلو لار	برآمدگیهای ناحیه انگشتان	استئوارتریت	استئوارتروز	استئوارتریت	شکستگی	عوارض تشخیصی جنس
۳۶/۳۶	۸	-	-	۱	۱	-	-	-	-	۲	-	-	-	۲	دوخون
۱۳/۶۴	۳	-	-	-	-	-	-	-	-	۱	۲	-	-	-	عرب
۱۸/۱۸	۲	-	-	۱	-	-	۱	-	-	-	-	-	-	۲	تروبرد
۳۱/۸۲	۷	۱	۲	-	-	-	-	-	۱	۱	-	-	-	۲-	نامشخص
۲۲	۱	۲	۲	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۴	۲	۲	۴	تعداد	
۱۰۰	۴/۵۵	۹/۰۹	۹/۰۹	۴/۵۵	۴/۵۵	۴/۵۵	۴/۵۵	۴/۵۵	۴/۵۵	۱۸/۱۸	۹/۰۹	۹/۰۹	۱۸/۱۸	درصد	

نتایج بررسی El-Guindy و همکاران در سال ۱۹۸۶ روی تعداد ۱۹۶ راس اسbe مبتلا به استئوارتروز مزمن مفصل بین انگشتی بالای نشان داد که در ۶۵/۶ درصد موارد تشکیل استخوان جدید در مفاصل مبتلا از نشانه‌های رادیوگرافی این عارضه می‌باشد (۲).

در مطالعه حاضر نیز تشکیل استخوانهای جدید (استئوفیت) در مفاصل بین انگشتی بالای (۳) مورد (۱) پایینی از نشانه‌های بارز رادیوگرافی در گیریهای استحاله‌ای (دز نر اتیو) این مفاصل می‌باشد و از آنجا که مفصل بین انگشتی

دست آمده در این تحقیق همخوانی دارد. همچنین تقریباً همه موارد شکستگی سالتر-هاریس صفحه رشد بالای استخوان زند اعلی از تیپ II می‌باشد (۱۰) که با یافته حاصل از این مطالعه مطابقت دارد. شکستگی‌های استخوان ران در کره اسbehای شایع می‌باشد (۳) در یک بررسی گزارش شده است که ۲۵ درصد از کره اسbehای مبتلا به شکستگی استخوانهای طویل، دارای شکستگی دیافیز استخوان ران بوده‌اند (۳) که این موضوع نیز با نتایج به دست آمده از این بررسی همخوانی دارد.



جدول ۵- فراوانی عوارض تشخیصی بر حسب سن، جنس و محل عارضه در الاغهای مورد بررسی.

درصد تعداد	NSAD	بیماری جیوب حلقی	شکستگی کامل	عارضه		سن
				بند سوم	بند دوم	
۱۲/۵۰	۱	-	-	-	ماده	نابالغ
۳۷/۵۰	۳	۱	-	۱	۱	ماده
۵۰	۴	۲	-	-	نامشخص	بالغ
	۸	۴	۲	۱	۱	تعداد
۱۰۰		۵۰	۲۵	۱۲/۵	۱۲/۵	درصد

شد. به طور کلی در تشخیص بسیاری از عوارض و بیماریهای در تک سمی ها، در صورت وجود دستگاه رادیولوژی مناسب می توان از رادیوگرافی به عنوان یک روش کمک تشخیصی و در بعضی موارد تایید کننده تشخیص استفاده کرد، به طوری که می توان عنوان نمود در بررسی عوارض مختلف استخوانی و بیماریهای مختلف مفصلی و هچنین ارزیابی ساختاری ارگانها و نواحی مختلف بدن، اطلاعات با ارزش رادیوگرافی به مراتب از سایر روش‌های تشخیصی پاراکلینیکی ارزش تشخیصی بیشتری دارد.

References

1. Ainsworth, D. M., Hackett, R. P. (2004): Diagnostic approach to respiratory disorders. In: Equine Internal Medicine, Second edition, edited by S.M. Reed, W.M. Bayly, D.C. Sellon, Saunders, St. Louis, USA. PP: 289-298.
2. El- Guindy, M.H., Ali, M.A. and Samy, M.T. (1986): Chronic osteoarthritis in the equine proximal interphalangeal joint. Equine Pract, 8: 6-15.
3. Hance, S. R., Bramlage, L. R. (1996): Fractures of the femur and patella. In: Equine Fracture Repair, First edition, edited by A. J. Nixon, Philadelphia, W. B. Saunders Co. P: 284-293.
4. Neuwirth, L., Gregg Boring J. (2002): The equine carpus. In: Textbook of Veterinary Diagnostic Radiology. 4th edition, edited by D. E. Thrall, Saunders, St. Louis, USA. PP: 227-246.
5. Nixon, A. J. (1996): General considerations in selecting cases for fracture repair. In: Equine Fracture Repair, 1st edition, edited by A. J. Nixon,

جدول ۶- فراوانی عوارض تشخیصی بر حسب سن، جنس و محل عارضه در قاطرهای مورد بررسی.

درصد تعداد	نرم مفصل زانو	تورم بافت برآمدگیهای استخوانی	شکستگی کامل			عارضه
			بند ۱، ۲ و ۳ انگشت	بند اول	قلم دست انگشت	
۲۰	۱	۱	-	-	-	ماده نابالغ
۶۰	۲	-	۱	۱	۱	ماده بالغ
۲۰	۱	-	-	-	۱	نامشخص بالغ
	۵	۱	۱	۱	۱	تعداد
۱۰۰	۲۰	۲۰	۲۰	۲۰	۲۰	درصد

بالای وزن بیشتری را نسبت به مفصل بین انگشتی پایینی متتحمل می شود به نظر می رسد احتمال بروز تغییرات استخوانی در مفصل بین انگشتی بالای بیشتر باشد (۶) که در یافته های این مطالعه نیز چنین نتیجه ای به دست آمد. بیشترین موارد آرتربیت عفونی که باعث لنگش شدید و اتساع کپسول مفصلی می گردد، در کره اسبهای دیده می شود (۴) و همچنین براساس نتایج حاصل از یک مطالعه، این عارضه به ترتیب در مفاصل تارس (۲۴ درصد)، قلمی بندانگشتی (۲۰ درصد)، کارپ (۱۸ درصد) و رانی - کشکی - درشت نی ای (۹ درصد) و قوع می یابد (۷ و ۸). علی رغم مطالب مذکور، در تحقیق حاضر تشخیص ۲ مورد آرتربیت عفونی در مفصل کارپ اسبهای بالغ و به علت وجود خمها متنفذه در نواحی نزدیک این مفصل بوده است.

در این مطالعه در ۲ مورد، از رادیوگرافی به منظور تایید تشخیص بیماری لامینایتیس استفاده شد. لازم به ذکر است که در اسبهای بانشانه های در دنایه سم و لنگش که احتمال حضور لامینایتیس وجود دارد، ارزیابی رادیوگرافی تشخیص نهایی را میسر می سازد (۶). همچنین در بیماری لامینایتیس رادیوگرافی علاوه بر ارزش تشخیصی در تعیین پیش آگهی عارضه و انتخاب روش مناسب درمان نیز حائز اهمیت است (۶).

در این مطالعه رادیوگرافی از یک راس اسب بالغ بانشانه های بالینی بیماری ناویکولار تشخیص این بیماری را مورد تایید قرار داد. بیماری ناویکولار به عنوان یک سندروم مزمن پیشرونده، استخوان ناویکولار ادرگیری می کند و غالبا هر دو اندام حرکتی قدامی را مبتلامی سازد. برای تشخیص این عارضه آزمایش های پاتوگنومونیک بالینی وجود ندارد و تشخیص مبتنی بر ارزیابی گامها، موضعی شدن در درنایه خلفی پاشنه و حضور نشانه های رادیوگرافی تغییرات دنراتیو استخوان ناویکولار می باشد. بدینه است که تایید تشخیص بیماری ناویکولار براساس یافته های بالینی و رادیوگرافی (به صورت توأم) استوار می باشد (۹).

رادیوگرافی می تواند در تشخیص توده های بافت نرم (آبسه، هماتوم، و نئوپلاسم) یا تجمع مایع در داخل جیوب حلقوی و نواحی عقب حلق کاملاً مفید می باشد (۱). در تحقیق حاضر نیز به کمک تکنیک رادیوگرافی مواردی از درگیری بافت های نرم از جمله بیماری جیوب حلقوی و آبسه و تورم بافت نرم تشخیص داده



- Philadelphia, W. B. Saunders Co. P: 30-35.
6. Riedesel, E. A. (2002): The phalanges. In: Textbook of Veterinary Diagnostic Radiology. 4th edition, edited by D. E. Thrall, Saunders, St. Louis, USA. PP: 269-294.
 7. Schneider, J. P., Jackman, B.R. (1996): Fractures of the third metacarpus and metatarsus. In: Equine Fracture Repair, 1st edition, edited by A. J. Nixon, Philadelphia, W. B. Saunders Co. P: 179-194.
 8. Stashak, T.S. (2002): Adams' Lameness in Horses. Fifth edition, Philadelphia, Lippincot Williams & Wilkins. P: 577.
 9. Toal, R. L. (2002): The navicular bone. In: Textbook of Veterinary Diagnostic Radiology. 4th edition, edited by D. E. Thrall, Saunders, St. Louis, USA. PP: 295-305.
 10. Watkins, J. P. (1996): Fractures of the tibia. In: Equine Fracture Repair, Edited by A. J. Nixon, 1st edition (Ed) Philadelphia, W. B. Saunders Co. P: 273-283.


