

سنگ کیسه صفرا در گوسفندان و گاوها ارجاعی به کشتارگاههای اطراف تهران

*دکتر زهره خاکی^۱

دریافت مقاله: ۲۹ مهرماه ۱۳۸۲
پذیرش نهایی: ۱۵ دیماه ۱۳۸۳

Gallstones in Sheep and Cows Slaughtered at Tehran Abattoirs

Khaki, Z.^۱

^۱Department of Clinical Sciences, Faculty of Veterinary Medicine, University Tehran, Tehran-Iran.

Objective: Search gallstone in sheep and cows.

Design: Cross Sectional.

Animals: Sheep and cows.

Procedure: In this survey, 336 and 250 gallbladder of slaughtered sheep and cows were studied in Tehran slaughterhouse, respectively. Chemical analysis of bile (cholesterol, total bilirubin, indirect bilirubin and calcium) from animals with and without gallstones were done.

Statistical analysis: T-test ($P < 0.05$).

Results: The qualitative chemical analysis of the gallstones showed that calcium bilirubinate, cholesterol and calcium carbonate was present. Chemical analysis of bile from animals with and without gallstones did not show any statistically significant difference ($P < 0.05$). This is the first report from Iran.

Conclusion: Observations Showed gallstones in sheep and cow were pigment ones. *J.Fac.Vet.Med. Univ. Tehran. 60,4:401-403,2005.*

Keywords: gallstone, cholelithiasis, bile, cow, sheep, Iran.

Corresponding author's email: zkhaki@chamran.ut.ac.ir

عمده‌ترین مواد جامد موجود در آن شامل اسیدهای صفراوی، لیستین، موسین، رنگدانه‌ها، کلسترول، چربی، املاح معدنی (کلرورهای بیکربنات)، فسفات‌از قلیایی، بیلی‌روبین و فسفولیپیدها می‌باشند. پاره‌ای از مواد سمی و دارویی نیز با صفرادفع می‌شود. کاتیونها شامل سدیم، پتاسیم، کلسیم و آنیونها شامل بیکربنات، کلرواملاح صفراوی نیز جزء ترکیبات صفراوی می‌باشند. در گوسفند که صفرازمان زیادی در کیسه صفرا نمی‌ماند الکتروولیت‌های صفرای کبدی تقریباً به اندازه پلاسمای شیرابه پانکراس می‌باشد (۲,۵). سنگ‌های صفراوی، ساختارهای بلوری هستند که از طریق تغليظ یا تراکم و سفت شدن اجزای طبیعی یا غیرطبیعی صفرا ایجاد می‌شود به سه نوع عمده رنگدانه‌ای، مختلط و کلسترولی تقسیم می‌شوند. هرگونه تغییر در ساختار طبیعی محتويات صفرا می‌تواند باعث ایجاد سنگ شود (۲,۶).

مواد و روش کار

در این بررسی که در سال ۱۳۸۰ در کشتارگاههای اطراف تهران صورت

هدف: جستجوی سنگ کیسه صفرا در گوسفندان و گاوها ارجاعی به کشتارگاههای اطراف تهران.

حیوانات: گوسفند و گاو.

طرح: مطالعه کشتارگاهی.

روش: در این بررسی از کیسه صفرا ۳۳۶ راس گوسفند و ۲۵۰ راس گاو ارجاعی به کشتارگاههای اطراف تهران نمونه برداری شد و پس از باز کردن آنها، محتويات آنها از نظر سنگ مورد توجه قرار گرفت. آنالیز سنگ‌های صفراوی در آزمایشگاه صورت گرفت. صفراوی دامهای مبتلا و غیر مبتلا به سنگ نیز از نظر کلسترول، کلسیم، بیلیروبین تام و بیلیروبین غیر مستقیم آزمایش گردید. برای تجزیه و تحلیل آماری از آزمون تی استیودنت (t) استفاده شد.

نتایج: در ۱۶ راس گوسفند (۴/۷۵٪) و ۱۴ راس گاو (۵/۶٪) سنگ کیسه صفرا مشاهده شد. جنس سنگ‌ها از بیلیروبینات کلسیم، کلسترول و کربنات کلسیم بود. هیچگونه اختلاف آماری معنی داری بین ترکیبات صفرا در صفراهای فاقد سنگ در مقایسه با صفراهای دارای سنگ مشاهده نشد.

نتجه گیری: در گاوها و گوسفندان مورد بررسی جنس سنگ‌های صفراوی از نوع رنگدانه‌ای می‌باشد. مجله دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران، ۱۳۸۴، دوره ۶۰، شماره ۴۰۳-۴۰۱.

واژه‌های کلیدی: سنگ کیسه صفرا، کوله لیتیازیس، گاو، گوسفند، ایران.

سنگ کیسه صفرا برخلاف انسان در حیوانات کمتر مورد توجه قرار گرفته است. سنگ‌های صفراوی معمولاً از طریق ایجاد التهاب یا انسداد به دنبال مهاجرت به مجرای سیستیک یا مجرای صفراوی مشترک باعث ایجاد علائمی همچون کولیک صفراوی، کوله سیستیت حاد و مزمن، یرقان انسدادی و پانکراتیت حاد می‌شود. کولیک صفراوی اختصاصی ترین و مشخص ترین علامت سنگ کیسه صفراوی می‌باشد که به طور کاملاً ناگهانی شروع و ممکن است به مدت ۴-۱۱ ساعت ادامه وسیس به تدریج یا به طور ناگهانی تخفیف یابد (۲,۵).

صفرا مایعی است صاف، سیال، زرد طلائی یا سبزرنگ، تلح مزه که در پستانداران گوناگون به حالت اسیدی و قلیایی است و pH آن از ۷/۸ تا ۹/۵ در نوسان است. صفراوی گاوی در تاپستان به رنگ قهوه‌ای زرد است ولی در زمستان سبزرنگ می‌باشد (۵).

ترکیبات صفرا عبارت است از آب (۶۸درصد) و مواد جامد (۱۴درصد).

(۱) گروه علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران، تهران - ایران.

(*) نویسنده مسؤول: zkhaki@chamran.ut.ac.ir



جدول ۱ - نتایج آزمایشگاهی سنگ کیسه صفرادر گوسفند و گاو.

گاو	گوسفند	درصد ابتلا	
% ۵/۶	% ۴/۷۵		
۴۶/۶۶±۱۰/۳۸	۴۷/۵±۹/۲	بیلیرو بینات کلسیم	جذب سنگها
۲۹/۱۶±۸/۱	۳۷/۵±۶/۱	کلسترول	
۲۲/۵±۹/۱	۱۵±۵/۷	کربنات کلسیم	
۴ تابسیار زیاد	۱-۱۵ عدد	تعداد سنگها	
۵/۷ میلیمتر	۵-۴ میلیمتر	اندازه سنگها	
سیاه تا قهوه‌ای تیره	سیاه	رنگ سنگها	
نامنظم و زاویه دار گاهی منظم	اکثرا گرد و منظم گاهی نامنظم	شكل سنگها	
اکثر استفت	نرم یا سافت	قوام سنگها	

در یک راس گوسفند سنگ کیسه صفراء مخلوطی از رنگ‌های قرمز و سیاه را داشت.

شد (۶/۵ درصد). در برخی از موارد که سنگ کیسه صفراء مشاهده شد کبد نیز زرد رنگ بود و مایع صفرانیز گاهی زرد پر رنگ و در ۴۰ مورد به شدت قهوه‌ای و یا سیاه رنگ بود. پس از تجزیه شیمیایی سنگ‌ها مشخص گردید که ۴۶/۶۶±۱۰/۳۸ درصد آنها از بیلیرو بینات کلسیم و مابقی کلسترول و کربنات کلسیم می‌باشد (جدول ۱). در گاو نیز هیچ‌گونه اختلاف آماری معنی داری مابین ترکیبات صفراء در مبتلایان و غیر مبتلایان به سنگ مشاهده نشد (جدول ۲).

بحث

گزارشات کمی در ارتباط با سنگ‌های کیسه صفراء در حیوانات وجود دارد و تاکنون گزارشی از سنگ‌های کیسه صفراء در گاو و گوسفندان در ایران نیز وجود ندارد. این بررسی که برای اولین بار است در ایران صورت می‌گیرد به ارزیابی چگونگی حضور سنگ کیسه صفراء در حیوانات مذکور در کشتارگاه‌های اطراف تهران پرداخته است.

با توجه به خصوصیات سنگ‌های صفراء و گاوها که همگی بالغ بودند سنگ کیسه صفراء مشاهده که قسمت اعظم مواد تشکیل دهنده آن‌ها را بیلیرو بینات کلسیم تشکیل

گرفته است کیسه صفرای ۳۳۶ راس گوسفند (۱۴۸ راس نابالغ و ۱۸۸ راس بالغ) و ۲۵۰ راس گاو (۴۹ راس نابالغ و ۲۰۱ بالغ) پس از برداشت از نظر سنگ مورد بازرسی قرار گرفتند. بدین ترتیب که با اسکالپل کیسه صفراءها باز شد و محتویات آنها به داخل ظروف آزمایشگاهی ریخته شد. در صورت مشاهده سنگ، آنها را جمع آوری کرده و برای آزمایشات بیوشیمیایی به آزمایشگاه ارسال می‌شدو با استفاده از کیت مرک جنس سنگ هامشخص گردید. بدین ترتیب که ابتدا سنگ هارا با آب مقطر سرد شستشو داده تمامی اجسام خارجی که احتمالاً در روی لایه خارجی وجود دارد پاک شده و پس از خشک کردن کامل آنها خصوصیات فیزیکی سنگ‌ها را از نظر رنگ، قوام، شکل، ابعاد، وزن و تعداد بررسی کرد. سپس با استفاده از محلولهای اسیدی، اکسالات آمونیوم، کلروفرم و اسید تری کلر استیک موجود در کیت به شناسایی جنس سنگ‌ها پرداخته شد. از صفرای دام‌هایی که سنگ کیسه صفراء داشتند نیز نمونه برداری شد و جهت آنالیز شیمیایی و اندازه‌گیری کلسترول (روش آنزیمی پارس آزمون-CHOD)، کلسیم (روش کرزول فتالئین پارس آزمون)، بیلیرو بین تام و بیلیرو بین مستقیم و غیر مستقیم (روش DAC پارس آزمون) به آزمایشگاه ارسال شد. جهت مقایسه به تعداد دام‌هایی که سنگ داشتند از صفرای دام‌هایی که سنگ نداشتند نیز نمونه برداری گردید و پارامترهای فوق اندازه گیری شدند. جهت تجزیه و تحلیل آماری از آزمون تی استیو دنت ($p < 0.05$) استفاده شد.

نتایج

گوسفند: در بررسی حاضر در ۱۶ راس از ۳۳۶ راس گوسفند (۵ راس نابالغ و ۱۱ راس بالغ) سنگ کیسه صفراء مشاهده شد. بنابراین میزان شیوع سنگ کیسه صفرای ۷۵/۴ درصد (۲۷/۴ درصد در بالغ‌ها و ۴۹/۱ درصد در نابالغ‌ها) بود. در مواردی که سنگ در صفراء وجود داشت کبد زرد رنگ به نظر می‌آمد، بویژه زمانی که در کیسه صفراء انگل وجود داشت. پس از تجزیه شیمیایی سنگ‌ها، مشخص گردید که ۴۷/۵±۹/۲ درصد آن‌ها از بیلیرو بینات کلسیم و مابقی از کلسترول و کربنات کلسیم می‌باشد. برای مقایسه بهتر، مشخصات کامل سنگ‌های در جدول شماره یک آمده است. هیچ‌گونه اختلاف آماری معنی داری بین ترکیبات صفراء در صفراء فاقد سنگ در مقایسه با صفراءهای دارای سنگ مشاهده نشد (جدول ۲).

گاو: در ۱۴ راس از گاوها که همگی بالغ بودند سنگ کیسه صفراء مشاهده

جدول ۲ - تجزیه شیمیایی صفرای واحد سنگ و بدون سنگ در گاو و گوسفند.

بیلیرو بین غیر مستقیم (mg/dl)		بیلیرو بین مستقیم (mg/dl)		بیلیرو بین تام (mg/dl)		کلسیم (mg/dl)		کلسترول (mg/dl)			
گوسفند	گاو	گوسفند	گاو	گوسفند	گاو	گوسفند	گاو	گوسفند	گاو	گوسفند	گاو
۲۵/۴±۴/۴	۳۰/۷±۴	۱۴/۸±۴/۸	۱۲/۹±۴/۵	۴۰/۲±۷/۱	۴۳/۶±۵/۲	۲۸/۴±۹/۳	۲۶/۴±۵/۱	۴۰/۵±۱۵	۳۸/۵±۱۲	صفرا واحد سنگ	
۲۷/۸±۳/۵	۲۳/۸±۱۰	۱۴/۸±۴	۱۵/۸±۲/۴	۴۲/۶±۵/۱	۳۹/۶±۶/۱	۲۷/۴±۸/۴	۲۱/۴±۸/۱	۴۱/۵±۱۶	۳۹/۵±۱۴	صفرا بدون سنگ	



دلیل منطقه‌ای بودن وقوع سنگ کیسه صفرا چیست؟ آیا به دلیل تغذیه با گیاهان یا آب آشامیدنی موجود در منطقه است یا نحوه نگهداری و موارد احتمالی دیگر همچون بیماریهای منطقه‌ای در این ارتباط دخیل است. نتایج این پژوهش نشان داد که سنگ کیسه صفرا در گاوها و گوسفندان ایرانی وجود دارد و به هنگام معاینات بالینی می‌باشد در دام‌هایی که علائم ذکر شده را دارند مورد توجه قرار گیرد. جالب است که بدانیم جنس سنگ‌های صفراوی که در گوسفندان و گاوها مشاهده شده، همانند سنگ‌های صفراوی است که در انسان‌های آفریقایی یافت گردیده است. در کشورهای آفریقایی نیز مردم از رژیم‌های غنی از فیبر و فقیر از پروتئین‌ها، چربی و مواد قندی استفاده می‌کنند (۴).

می‌دهد می‌توان جنس سنگ‌های رنگدانه‌ای دانست. با اینکه محققین دیگر نیز جنس سنگ‌ها را در نشخوارکنندگان از نوع رنگدانه‌ای گزارش کرده‌اند ولی جنس سنگ‌ها در گزارشات آنان یا فقط از نوع بیلیرو بین است (۷) و یا فقط از نوع پروپیونات کلسیم (۴). در بررسی حاضر نه تنها بیلیرو بینات کلسیم بلکه کلسترول و کربنات کلسیم نیز در سنگ‌های جدا شده وجود داشت که احتمالاً این موضوع در ارتباط با بهره جستن از روش‌های متفاوت است. زیرا هر سه ترکیب فوق از ترکیبات مهم و اصلی کیسه صفرا می‌باشند. Holtenius در سال ۱۹۸۹ معتقد است که در صورتی که نشخوارکننده با مواد دانه‌ای زیاد تغذیه شود سنتز کلسترول کاهش و در صورت استفاده از علوفه خشکی زیاد، میزان کلسترول سرم و صفرای آنها افزایش می‌یابد (۱) که این نکته را می‌توان دلیل حضور کلسترول در سنگ‌های صفراوی دانست زیرا هرگونه عاملی که باعث اختلال در تخلیه و یا ترکیبات کیسه صفرا شود می‌تواند عاملی برای رسوب ترکیبات طبیعی آن به حساب آید.

عفونتهای مزمون مجاری صفراوی و آلدگی‌های مزمون انگلی یکی از علل دیگر ایجاد سنگ‌های رنگدانه‌ای است (۲). در کیسه صفرا ۷ درصد از گوسفندان و گاوها ایرانی انگل‌هایی همچون دیکروسلیوم دندرتیکوم، فاسیولا هپاتیکا و استیلزیا هپاتیکا مشاهده شد که در بسیاری از موارد، حضور سنگ و انگل هاتواند مشاهده شد. هرچند که سنگ کیسه صفرا بدون وجود انگل‌های نیز وجود داشت.

افزایش سن یکی از دلائل فراوانی ایجاد سنگ‌های صفرا در بالغین می‌باشد (۳). با اینکه Wood و همکاران در سال ۱۹۷۴ در ۵۰ درصد از جنین‌های ۱۰۲ روزه سنگ کیسه صفرا را گزارش کرده‌اند Petrucci و همکاران در سال ۱۹۸۸ در ۲/۴ درصد از گوسفندان نابالغ سنگ کیسه صفرا را گزارش کرده‌اند. در صورتی که Mentzner در سال ۱۹۳۴ در هیچ یک از بردهای مورد مطالعه سنگ صفراوی نیافت (۳، ۴، ۷). در بررسی حاضر در ۵ راس گوسفند نابالغ (۱/۴۸ درصد) سنگ مشاهده شد. در حالی که در هیچ یک از گوساله‌ها سنگی یافت نشد.

علاوه بر عوامل ژنتیکی، یکی از علل دیگر تشکیل سنگ‌های رنگدانه‌ای، منطقه جغرافیایی می‌باشد (۲). در تحقیقات Petrucci و همکاران در سال ۱۹۸۸ که بر روی شیوع کوله لیتیازیس گوسفند در ایتالیا صورت گرفته است، ۱۱/۷۱ درصد گوسفندان بالغ مبتلا به سنگ کیسه صفرا بوده‌اند (۴). در صورتی که در گزارشات Mentzner در سال ۱۹۳۴ که از کالیفرنیا صورت گرفته است ۱/۵۷ درصد گوسفندان بالغ ابتلا به سنگ رانشان داده‌اند (۳). در این بررسی نیز با توجه به درصد کاملاً متفاوت گوسفندان و گاوها مبتلا به سنگ کیسه صفرا نسبت به سایر محققین، منطقه‌ای بودن سنگ کیسه صفرا کاملاً مشخص می‌گردد. ضمن آنکه در حین بررسی متوجه شدیم که در یک روز مشخص از دام‌های یک منطقه، در چندین مورد سنگ مشاهده گردید، در حالی که در گله‌هایی از مناطق دیگر سنگ صفراوی جدانگر دید. البته تحقیقات بیشتری باید صورت گیرد تا مشخص گردد که

References

1. Holtenius, P.(1989): Plasma lipid in normal cows around partus and in cows with metabolic disorders with and without fatty liver. *Acta. Vet. Scand*, 30:441-445.
2. Mayene, P.D.(1994):Clinical Chemistry in Diagnosis and Treatment. 6th ed., Edward Arnold, London , PP:293- 295.
3. Mentzner, S.H.(1934):Cholecystic disease in pigs , sheep and cattle. California and Western Medicine, Vol. 40, P: 333.
4. Petruzzi, j., Mangini ,V ., Messa , C ., Misciagna , G . and Donna, R.D. (1988): Spontaneous cholelithiasis in sheep: Prevalence survey and analysis of gallstones and bile. *J. Comp. Path.* 98:367-369.
5. Ruckebusch,y., Phoneuf, L-P.and Dunlop, R.(1991): Physiology of Small and Large Animals . B.C.Decker.Inc. Philadelphia,PP: 269-274.
6. Siedel,J.(1981):A simple method to analyze bile cholesterol. *Clinical Chemistry and Biochemistry*, 19:833-841.
7. Wood , J R., France,V. and Sutar,D.J.(1974): Occurrence of gallstones in foetal sheep . *Lab. Anim.*, 8:155-159.

