

مطالعه آناتومی و بافت شناسی کیسه حنجره‌ای الاغ

مریم رضاییان^{۱*} جواد صادقی نژاد^۲ فردوس ابراهیم پور^۱

(۱) گروه علوم پایه دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران، تهران - ایران.

(۲) گروه علوم پایه دانشکده دامپزشکی دانشگاه تبریز، تبریز - ایران.

(دریافت مقاله: ۲۲ اسفند ماه ۱۳۸۹ ، پذیرش نهایی: ۱۸ مرداد ماه ۱۳۹۰)

چکیده

الاغ به عنوان حیوان کاری مورد استفاده قرار گرفته و در اقتصاد کشورهای در حال توسعه نیز نقش زیادی دارد اما با این وجود اطلاعات کمی در رابطه با ساختار آناتومی و بافت شناسی دستگاه تنفس آن وجود دارد. برای این منظور کیسه حنجره (Laryngeal Saccule)^۴ راس الاغ سالم مورد بررسی قرار گرفته و نمونه‌های بافت شناسی پس از ثبوت در فرماین^{۱۰} درصد و تهیه مقاطع بافتی به روش هماتوکسلین و ائوزین رنگآمیزی و توسط میکروسکوپ نوری مورد مطالعه قرار گرفتند. مطالعات آناتومی نیز روش‌های متداول انجام و تصاویر لازم تهیه گردید. الاغ در مقایسه با اسب دارای اپی‌گلوت کوتاه تر با راس تیزتر می‌باشد و بطن حنجره‌ای نیز همانند اسب موجود بوده اما کیسه حنجره‌ای بزرگ بوده و از طریق سوراخ کوچک مدوری به فضای داخلی حنجره باز می‌شود. اپی‌تیلیوم آن از نوع استوانه‌ای شبیه مطبق مژه دار بوده و غدد سروزی-موکوسی فراوان، شبکه وسیع و ریدی-لنفاوی و عقده‌های لنفاوی از عناصر موجود در دیواره آن می‌باشد. عضله Thyroarytenoid حجیم بوده و به دو قسمت تقسیم می‌شود که احتمالاً در خروج ترشحات غدد موجود در جدار کیسه حنجره‌ای نقش دارد. به نظر می‌رسد که خصوصیات غیر معمول صدای الاغ باشکل و موقعیت این ساختارها مرتبط بوده و به عنوان فضاهای تشديده کننده صوت نقش داشته باشند که البته مطالعات بيشتر در اين زمينه مورد نيازمند باشد.

واژه‌های کلیدی: بافت شناسی، آناتومی، حنجره، الاغ.

مواد و روش کار

در مطالعه حاضر، راس الاغ که جهت عملیات کالبدشناسی خریداری شده بودند و فاقد هرگونه نشانه‌های بالینی اختلالات تنفسی بودند مورد استفاده قرار گرفت. براین اساس ۲ راس الاغ با روش معمول جهت مطالعات کالبدشناسی آماده سازی شد. سپس با جداسازی حنجره و ساختارهای متصل به آن، خصوصیات ظاهری حنجره بررسی و تشریح دقیق غضروف‌ها، عضلات و مخاطات حنجره جهت شناسایی بطن‌های حنجره‌ای و نیز کیسه حنجره‌ای صورت گرفت و ضمن مقایسه با نمونه‌های حنجره‌ای اسب موجود، تصاویر لازم نیز تهیه گردید. جهت انجام مطالعات بافت شناسی نیز سروگردن ۲ راس الاغ دیگر جداسازی و با خروج حنجره آن‌ها، برش ذوزنقه‌ای بر روی لامینای غضروف تیروئیدی ایجاد و دیواره کیسه حنجره با دقت از حنجره جدا از منظور ثابت شدن در محلول فرماین بافر^{۱۰} درصد قرار گرفته و به آزمایشگاه بافت شناسی منتقل گردید. پس از مدت زمان کافی برای ثبوت، مراحل معمول جهت رنگ آمیزی بافت‌های روش هماتوکسلین و ائوزین انجام گرفت و سپس برش ها توسط میکروسکوپ نوری مورد مطالعه بافت شناسی قرار گرفته و تصاویر میکروسکوپی لازم نیز تهیه گردید.

نتایج


مطالعه نمونه‌های تشریح شده حنجره الاغ نشان داد که چین‌های درجهت قدامی-خلفی نسبتاً کوتاه است و با بررسی Aryepiglottic

مقدمه


الاغ (Equus asinus) از خانواده اسبان (Equidae) بوده و دارای دودمان مشترک با اسب (Equus caballus) است. اما از لحاظ مورفولوژیکی به صورت دو گونه مجزا دیده می‌شوند^(۶). جمعیت الاغ در جهان حدود ۴۴ میلیون راس برآورده می‌شود که درصد آن در کشورهای در حال توسعه وجود داشته که در اقتصاد روستایی نقش دارد^(۱۱). با وجود جمعیت قابل توجه این گونه و نیز گزارشات متعدد از مرگ و میرناشی از بیماری‌های تنفسی در این حیوان^(۱۰)، اطلاعات بسیار کمی در رابطه با آناتومی و بافت شناسی دستگاه تنفس در این حیوان و سایر حیوانات اهلی^(۲) وجود دارد.

حنجره یک لوله غضروفی کوتاهی است که قسمت تحتانی حلق را با نای مرتبط ساخته و در تولید صوت نیز نقش دارد و بطن‌های حنجره‌ای نیز حاصل بیرون زدگی مخاط حنجره می‌باشند^(۴, ۷, ۹). اگرچه مطالعات اولیه آناتومیکی، برخی خصوصیات دستگاه تنفس فوقانی و حنجره‌ای را مورد بررسی قرار داده اما اطلاعات دقیقی در این رابطه وجود ندارد^(۱, ۸). بنابراین مطالعه حاضر به منظور شناسایی بطن‌های حنجره‌ای و مطالعه دقیق تر خصوصیات آناتومیکی و بافت شناسی کیسه حنجره‌ای الاغ به عنوان جزء مهم دستگاه تنفس و احتمالاً موثر در تولید صوت انجام گرفته است.







تصویر ۲- نمای داخلی حنجره با برش میانی. غضروف هرمی (Ar)، چین صوتی (V)، چین دهلیزی (Ve) و بطن حنجره ای (LV) و سوراخ کيسه حنجره ای (O) نمایان است. بطن میانی حنجره (MV) در قائده ابی گلوت (Ep) دیده می شود.




تصویر ۱- نمای جانبی حنجره همراه با زانه تیروئیدی لامی (TH) و سایر استخوان های لامی متصل به آن. غضروف تیروئیدی (T) برش داده شده و زیر آن دو عضله (Ve) و در میان آن ها Vocalis (V) و Ventricularis (S) مشخص است. عضلات (CAD)، (CT) و (CAL) نیز مشاهده می شود.



تصویر ۴- جدار کيسه حنجره ای- علاوه بر ابی (تیلیوم) (E)، شبکه وسیع ریدی (V) در عمق و عرق لغافی (L) نزدیک به ابی تیلیوم مشاهده می شود. غدد فراوان موکوسی (M) و سروزی (x) به همراه مجاری آن ها (T) که به سطح باز می شوند نیز مشخص است. (H&E $\times 40$)



تصویر ۳- ابی تیلیوم استوانه ای شبکه مطبق مژه دار (E) و قسمتی از بفت هم بند زیرین آن (C) در جدار کيسه حنجره ای مشاهده می شود. (H&E $\times 120$).



تصویر ۵- فولیکول لغافی (F) زیر ابی تیلیوم (E) در جدار کيسه حنجره ای مشاهده می شود. علاوه بر آن غدد فراوان سروزی-موکوسی (G) به همراه مجاری آن ها (x) نیز مشخص است. (H&E $\times 10$).

دقیق موقعیت حنجره نسبت به کام نرم مشخص شد که دهانه ورودی حنجره موقعیت خلفی تری نسبت به حنجره اسپ دارد. عضله Thyroarytenoid به صورت توده عضلانی حجیم بوده که بوسیله بیرون زدگی جانبی مخاط حنجره به نام بطن حنجره ای (Ventricularis) (به طور مشخص به دو عضله Laryngeal ventricle) (در قدام) و Vocalis (در خلف) تقسیم شود (تصویر ۱). چین های صوتی (CAD) و (Ve) و دهلیزی (Vestibular fold) در حنجره الاغ نیز وجود دارند. چین صوتی دارای لبه قدامی مشخص و مقعر با طول ۳/۵-۴/۵ سانتیمتر بوده ولی چین دهلیزی کوتاه با طول ۱/۵-۱/۸ سانتیمتر است که روی دیواره حنجره پهن شده است (تصویر ۲).

بطن حنجره ای به صورت یک گودی وسیع بوده که بوسیله چین



Laryngeal saccule نامگذاری شود.

کیسه حنجره‌ای بوسیله بافت پوششی استوانه‌ای شبه مطبق بدون سلول‌های جامی پوشانده می‌شود. بافت هم بند زیرین اپی تیلیوم دارای غدد سروزی-موکوسی می‌باشد که غدد سروزی در آن غالب بوده و به صورت مجزاً باهلال ژیانوزی روی غدموکوسی مستقر می‌باشد. مجاری غدد نیز دارای اپی تیلیوم مکعبی مطبق بوده که به سطح باز می‌شوند. علاوه بر این شبکه وسیع وریدی-لنفاوی در بافت هم بند زیرین مشاهده می‌شود که عروق لنفاوی موقعیت سطحی تری داشته و بوسیله یک دارد که این ساختار برای اولین بار در کیسه حنجره‌ای گزارش می‌شود. به نظر می‌رسد این شبکه وسیع عروقی در کنترل فشار داخلی کیسه حنجره ای نقش داشته باشد. علاوه بر آن اتصال دستجات عضلانی آن هارادر تنظیم بازو و بسته شدن سوراخ حنجره‌ای آن و نیز کمک به خروج ترشحات غدد نشان می‌دهد. وجود فولیکول‌های لنفاوی منفرد در جدار کیسه حنجره‌ای نیز احتمالاً مربوط به نقش دفاعی آن در ناحیه حنجره می‌باشد.

این در حالی است که براساس مطالعات قبلی، جدار کیسه حنجره حاوی بافت لنفاوی منتشر نزدیک اپی تیلیوم بوده و غدد موجود در پارین و زیر مخاطن نیاز از نوع موکوسی گزارش شده است^(۸).

در مطالعه حاضر صرف اخصوصیات آناتومیکی و بافت شناسی کیسه و بطن‌های حنجره موربرسی قرار گرفت اما این ساختارها ممکن است در تولید صدا نیز نقش داشته باشند. صدای خاص الاغ (Braying) یک صدای بلند و نافذی بوده که امکان شناسایی و برقراری ارتباط با یکدیگر را برای این حیوان امکان پذیری می‌سازد. مشخص شده است که این صدا نتیجه هوای دم و بازدم بوده و علاوه بر حنجره، شکل نازوفارینکس و مجرای فوکانی تنفسی نیز در کیفیت تولید آن نقش دارد^(۸).

ار آنجائیکه Attenburrow در سال ۱۹۸۰، علت ایجاد صدای صوت (whistling) را در اسب‌های مبتلا به فلجنی یک طرفه حنجره، فرکانس‌های تشدید شده توسط کیسه و بطن‌های حنجره‌ای در این حیوانات معروفی کرده^(۲) و از طرف دیگر Bular در سال ۱۸۸۴، تولید صدای تنفسی را نتیجه عبور هوای از یک فضای تنگ به یک فضای وسیع ترمی داند^(۵)، لذا با توجه به وسیع بودن این ساختارها در الاغ، احتمال نقش آن‌ها در تولید صوت نیز افزایش می‌یابد.

از این جهت، مطالعات بیشتر با استفاده از تکنیک‌های رادیوگرافی و نیز استنتوسکوپ‌های رادیویی در حیوانات زنده جهت بررسی نقش آن‌ها در تولید صدا پیشنهاد می‌گردد.

دهلیزی وزائد میخی غضروف اپی گلوت از جلو و نیز چین صوتی در عقب وزائد صوتی غضروف هرمی در سطح پشتی محدود می‌شود. نزدیک کف حنجره الاغ در لبه قدامی-شکمی چین دهلیزی، دهانه مدوری وجود دارد که یک کیسه کوچک غشایی به نام Laryngeal saccule به آن باز می‌شود. این کیسه مابین غضروف تیروئیدی در سمت خارج و عضلات Vocalis و Ventricularis در داخل قرار دارد. کیسه حنجره‌ای از نزدیکی کف حنجره تابه پشتی غضروف تیروئیدی امتداد داشته و بوسیله یک کیسول فیبروزی احاطه شده است که دستجات عضلانی از عضلات Vocalis و Ventricularis نیز به دیواره آن متصل می‌شود. دیواره جانبی کیسول نیز به کمک یک بالشتک از بافت هم بند سست همراه چربی به غضروف تیروئیدی (در سمت خارج) متصل است. علاوه بر آن کیسه حنجره‌ای در الاغ از طریق مجرای کوتاه و وسیعی به طور کاملاً مجزا و بوسیله دهانه مدوری به بطن حنجره باز می‌شود^(تصویر ۱، ۲).

مطالعه بافت شناسی نیز نشان داد که اپی تیلیوم استوانه‌ای شبه مطبق مژه دار (بدون سلول‌های جامی) ته کیسه حنجره را می‌پوشاند (تصویر ۳). غدد سروزی-موکوسی فراوان و نیز بافت لنفاوی منتشر و همچنین فولیکول‌های لنفاوی منفرد به همراه شبکه وسیع وریدی-لنفاوی نیز از عناصر موجود در بافت هم بند زیرین اپی تیلیوم می‌باشند^(تصاویر ۴، ۵).

علاوه بر آن مطالعات آناتومی نشان داد که بطن میانی حنجره‌ای که حاصل بیرون زدگی سطح و نترال موکوس ناحیه قاعده اپی گلوت است به صورت یک گودی بانام Median laryngeal recess همانند حنجره اسپ وجود داشته که از طریق یک سوراخ با قطر حدود ۵/۰-۴/۰ سانتیمتری با فضای داخلی حنجره مرتبط است^(تصویر ۲).

بحث

از لحاظ غضروف‌های حنجره نیز مورفولوژی عمومی حنجره، اختلاف آناتومیکی در حنجره الاغ در مقایسه با اسپ محدود بوده و یکی از مهم‌ترین اختلافات قابل مشاهده، غضروف اپی گلوت در الاغ بوده که نسبتاً کوتاه و کمی نوک تیزتر می‌باشد و علاوه بر آن دهانه ورودی حنجره نیز در الاغ موقعیت خلفی تری دارد.

در اسپ بطن حنجره‌ای با گودی مخاطی آن از طریق سوراخ وسیعی بهم مرتبط اند و بر این اساس Nomina Anatomica Veterinaria در سال ۲۰۰۵، پیشنهاد می‌کند کل ساختار، بطن حنجره‌ای ventricle (Laryngeal) نامیده شود^(۸). این در حالی است که حنجره الاغ در مقایسه با اسپ دارای گودی کم عمق و وسیعی مابین چین‌های صوتی و دهلیزی به عنوان بطن حنجره‌ای است که کیسه مخاطی بزرگی از طریق یک سوراخ مجزا (نزدیک لبه شکمی چین دهلیزی) به آن باز می‌شود. این یافته‌ها با توصیفات Clayton و Lindsay در سال ۱۹۸۵ مطابقت دارد^(۸). بنابراین توصیه می‌شود که این کیسه مخاطی بزرگ در الاغ



References

1. Alsafy, M.A.M., El-Kammar, M.H., El-Gendy, S. A. A. (2008) Topographic Anatomy, Computed Tomography and Surgical approach of the Guttural Pouches of the Donkey. *J. Equine Vet. Sci.* 28: 215-222.
2. Ardalani, G., Abasi, M., Sadr Khanloo, R. (2000) Anatomical and histological studies of the Vomeronasal organ in Buffalo. *J. Vet. Res.* 55:5-10.
3. Attenburrow, D.P.C. (1980) Resonant frequency of the lateral ventricle and saccule and whistling. *Equine Exerc. Physiol.* 31:27-32.
4. Budras, K.D., Sack, W.O., Rock, S.(2003) Anatomy of the Horse, An Illustrated Text, Schlutersche, Hannover, Germany.
5. Bullar, J.P. (1884) Experiments to determine the origin of respiratory sounds. *Proc.Roy.Soc.* 37:411-413.
6. Burnham, S.L.(2002) Anatomical Differences of the Donkey and Mule. AAEP proceedings. 48:102-109.
7. Konig, H.E., Leibich, H.G. (2004) Veterinary Anatomy of Domestic Mammals. Schattauer, New York, USA.
8. Lindsay, F.E.F., Clayton, H.M. (1986) An anatomical and endoscopic study of the nasopharynx and larynx of the donkey. *J.Anat.* 144: 123-132.
9. Nickel, R., Shummer, A., Seiferle, E. (1979) The Viscera of the Domestic Mammals, (2nd ed.) Springer-Verlag, New York, USA.
10. Nomina Anatomica Veterinaria (2005) World Association of Veterinary Anatomists, (5th ed.) Hannover, Columbia, Gent, Sapporo: published by the Editorial Committee of the world Association of Veterinary Anatomists. W.A.V.A.
11. Thiemann, A.K., Bell, N.J.(2001) The Peculiarities of the Donkey Respiratory Disease. International Veterinary Information Service. New York, USA.



AN ANATOMICAL AND HISTOLOGICAL STUDY OF LARYNGEAL SACCULE OF THE DONKEY (*EQUUS ASINUS*)

Rezaian, M.^{1*}, Sadeghi Nezhad, J.², Ebrahimpoor, F.¹

¹Department of Basic Sciences, Faculty of Veterinary Medicine, University of Tehran, Tehran-Iran.

²Department of Basic Sciences, Faculty of Veterinary Medicine, University of Tabriz, Tabriz-Iran.

(Received 13 March 2011 , Accepted 9 August 2011)

Abstract:

Although donkeys play an important role as pack and draught animals, there is sparse information available on the histological and anatomical data for their respiratory tract. This study examined the larynxes of 4 healthy donkeys to provide data using histological techniques and anatomical dissection. The histological specimens were taken after fixation in 10% formalin and tissue passages were stained with hematoxylin and eosin, and then studied under a light microscope. The laryngeal muscles and mucosa, for anatomically studying the saccules, were dissected and photographed. Compared with the horse, the donkey epiglottis is relatively shorter and more sharply pointed. A shallow, thumb shaped depression on the rostral of each vocal fold corresponds in position to the laryngeal ventricle in the horse. In the donkey, large paired laryngeal saccules, interposed between the thyroarytenoideus M. and the thyroid cartilage, open into the laryngeal cavity through a small circular orifice. There is a pseudostratified ciliated columnar epithelium lined saccule. Sero-Mucus secreting glands, subepithelial lympho-venous plexuses and lymph follicles were present in its orifice wall. Furthermore, the large thyroarytenoideus M. is subdivided into ventricular and vocal parts, which are thought to control the expression of secretion from the laryngeal saccule. It seems that unusual characteristics of vocalization in the donkey may be related to the shape and orientation of these larynx resonance chambers. Further investigations are needed to clarify this point.

Key words: anatomy, histology, larynx, donkey.

*Corresponding author's email: rezaianm@vetmed.ut.ac.ir, Tel: +9821-61117117, Fax: +9821-66933222

