

ارزیابی مکانیسم‌های تحمل و آنتیزنوز در ژنوتیپ‌های جو در برابر شتۀ معمولی گندم، *Schizaphis graminum*

روژین احمدی^۱، سیدعلی صفوی^{۲*} و علیرضا عیوضی^۳

۱، دانشجوی کارشناسی ارشد و استادیار، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه، ۳، استادیار، مرکز تحقیقات

کشاورزی و منابع طبیعی ارومیه

(تاریخ دریافت: ۹۰/۹/۲۱ - تاریخ تصویب: ۹۲/۷/۲)

چکیده

شتۀ معمولی گندم، *Schizaphis graminum* (Rondani) (Hem.: Aphididae)، یکی از آفات مهم غلات به‌ویژه جو است که در سال‌های اخیر جمعیت رو به رشدی داشته است. یکی از راه‌ها مناسب‌ترین روش‌های کنترل این آفت با در نظر گرفتن آثار سوء ناشی از کاربرد آفت‌کش‌ها، استفاده از ژنوتیپ‌های مقاوم جو است. در این تحقیق، ۴۷ لاین پیشرفتۀ و ۱۳ رقم جو در مرحله گیاه‌چه غربالگری شد و دو مکانیسم آنتیزنوز و تحمل در آنها بررسی شد. آزمایش در گلخانه‌ای با شرایط دمایی $25 \pm 2^{\circ}\text{C}$ ، رطوبت نسبی $55 \pm 10\%$ و دورۀ نوری ۱۶:۸ انجام گرفت. غربالگری بر اساس میانگین تعداد شته (بعد از ۱۴ روز آلدگی با شته) انجام گرفت و ارقام ریحان، نصرت و لاین (Mall-4-3094- 2//Alpha/Cum/3/Victoria/...ICB01-۲۰) گرفت. آزمایش آنتیزنوز با شرایط دمایی $25 \pm 2^{\circ}\text{C}$ ، رطوبت نسبی $55 \pm 10\%$ و دورۀ نوری ۱۶:۸ (Sls/Bda//Sararood-1)، لاین ۱۳ (Legia/CWB117-5-9-5)، لاین ۴۴ (1368-0AP) با کمترین و لاین ۱۳ (Sls/Bda//Sararood-1)، لاین ۴۴ (Legia/CWB117-5-9-5) و رقۀ زرجو با بیشترین میانگین تعداد شته برای اجرای آزمایش‌های آنتیزنوز و تحمل انتخاب شدند. در آزمایش آنتیزنوز، بر اساس تعداد شته جلب شده (۲۴، ۴۸ و ۷۲ ساعت پس از رهاسازی) نتایج نشان داد در مجموع هر سه زمان رقم زرجو و ریحان به ترتیب کمترین و بیشترین آنتیزنوز را داشتند. در آزمایش تحمل (که بر اساس تأثیر تغذیه شته روی ارتفاع گیاهان آلدۀ بررسی شد)، نتایج نشان داد رقم ریحان بیشترین افزایش ارتفاع ثانویه (در مقایسه با شاهد) و کمترین درصد کاهش ارتفاع (در مقایسه با شاهد) و بیشترین درصد کاهش ارتفاع ثانویه (در مقایسه با شاهد) و بیشترین درصد کاهش ارتفاع ثانویه (در مقایسه با شاهد) را داشت.

واژه‌های کلیدی: آنتیزنوز تحمل، جو، شتۀ معمولی گندم، غربال.

می‌شوند). (Ng & Perry, 2004; Akhtar *et al.*, 2006). نتیجه تغذیه‌شته‌ها تخریب کلروپلاست گیاه است که سرانجام به کاهش سطح کلروفیل و فعالیت فتوسنتر منجر می‌شود (Burd & Elliott, 1996).

شتۀ معمولی گندم *Schizaphis graminum* (Rondani) یکی از شته‌های زیان‌آور غلات در شمال، مرکز و دشت‌های وسیع جنوب آمریکا، اروپا، آفریقا، خاورمیانه و آسیا است (Blackman & Eastop, 2000). دامنه میزبانی این آفت بسیار گسترده است و تاکنون میزبان‌های مختلفی از خانواده غلات از قبیل جو، گندم، برنج، ارزن، چاودار، یولاف، انواع سورگوم، ذرت و

مقدمه

بین گیاهان مختلف غلات از اهمیت زیادی برخوردارند. جو در میان غلات، در ایران دومین محصول زراعی مهم بعد از گندم (Tajbakhsh & Pourmirza, 2003) و در دنیا چهارمین محصول غله‌ای مهم بعد از گندم، برنج و ذرت محسوب می‌شود (Nour-mohamadi *et al.*, 2008). گونه‌های مختلفی از شته‌ها به Delp *et al.*, 2009) غلات حمله می‌کنند و با مکیدن شیرۀ گیاهی و تزریق بزاق سمی در هنگام تغذیه باعث ایجاد خسارت و کاهش چشمگیر عملکرد گیاه می‌شوند. علاوه بر این، شته‌ها از ناقل‌های مهم ویروس‌های گیاهی نیز محسوب

(1992)، بررسی مقاومت در ۴۰ لاین جو در برابر شته برگ یولاف (Taghizadeh, *Rhopalosiphum padi* (L.) ۲۰۱۱) و نیز بررسی مقاومت ۷۶ رقم جو به همراه یولاف (Pourhaji, ۱۹۹۷) از دیگر مطالعات انجام گرفته در زمینه مقاومت غلات به شته‌های غلات‌اند. البته بررسی‌های صورت گرفته نشان‌دهنده آن است که تاکنون در ایران تحقیقات بسیار کمی در زمینه مقاومت ژنتیکی‌های جو در برابر شته معمولی گندم صورت گرفته و مطالعات بیشتر در زمینه بررسی آنتی‌بیوز و پارامترهای رشدی شته مذکور بوده است که از جمله آنها می‌توان به بررسی دموگرافی شته معمولی گندم (Tofangsazi et al., 2011). ارقام مقاوم یکی از اجزای اساسی مدیریت تلفیقی آفات‌اند که همراه با دیگر روش‌های کنترل آفات کاربرد دارند (Panda & Khush, 1995). مقاومت گیاه میزبان اساس برنامه‌های مدیریت تلفیقی آفات غلات است (Murugan et al., 2010). وجود مقاومت در جو در برابر شته‌ها، برای کنترل خسارت‌های مستقیم و غیرمستقیم ناشی از آنها از صفات مطلوب در این گیاه تلقی می‌شود (Cheung et al., 2010). اهمیت محصول جو و شته معمولی گندم و آثار سوء مصرف سموم شیمیایی، تدوین یک راهبرد مناسب مدیریتی و راهکارهای قابل اجرا و مقرن به صرفه را اجتناب‌ناپذیر می‌کند. در این راستا، معرفی ارقام مقاوم به آفت، راه حلی مؤثر و کاملاً اقتصادی است Mashhadi-jafarloo (2001) که روش بسیار مناسبی برای حفظ محصول جو از خسارت شته معمولی گندم نیز به شمار می‌رود. تحقیق حاضر در همین راستا و با هدف بررسی دو مکانیسم مقاومت (آن‌تی‌زنوز و تحمل) در ژنتیکی‌های جو در برابر شته معمولی گندم انجام گرفته است. نتایج این بررسی در شناسایی ژن‌های مقاومت و توسعه و معرفی ارقام مقاوم بسیار مفید است.

مواد و روش‌ها

پژوهش شته و گیاه میزبان
در تحقیق حاضر از ۶۰ لاین و رقم جو استفاده گردید که بذور ۴۷ لاین جو تحت مطالعه در این تحقیق

گندمیان وحشی برای آن گزارش شده است (Nuessly & Nagata, 2005) کوتولگی زرد جو بهویژه نژاد (BYDV-SGV) است. علاوه بر این، ویروس قرمی برگ ارزن، ویروس موزاییک نیشکر و ویروس موزاییک کوتولگی ذرت را نیز انتقال می‌دهد (Blackman & Eastop, 2000). شایان ذکر است که شته معمولی گندم دارای بیوتیپ‌های متعددی در مناطق مختلف است (Lage et al., 2003). مدیریت جمعیت شته‌ها دشوار است، زیرا چرخه زندگی آنها کوتاه است و نرخ تولید مثل بسیار بالایی دارد. مصرف مقادیر زیاد حشره‌کش‌ها نیز به اکوسیستم و محیط‌زیست آسیب می‌رساند و حشرات غیرهدف و مفید (شکارگرهای پارازیتوبیدها و گردهافشان‌ها) را نابود می‌کند و منجر به ایجاد سطوح بالایی از مقاومت در گونه‌های مختلف شته‌ها می‌شود که این مسئله کنترل شته‌ها را بعرنج تر می‌کند. در سال‌های اخیر، به علت سه‌پاشی‌های بی‌رویه علیه سن گندم و از بین رفتن دشمنان طبیعی در بعضی مناطق، شته معمولی گندم (Esmaili et al., 2002) حالت طغیانی پیدا کرده است کاهش تغذیه شته‌های غلات روشنی برای جلوگیری از کاهش عملکرد گندم و جو و دیگر غلات است و استفاده از گیاهان مقاوم راهبردی مؤثر در این زمینه قلمداد می‌شود، زیرا به لحاظ اقتصادی پذیرفتگی و برای محیط‌زیست، سالم و بدون هیچ گونه آثار مخرب است (Hesler & Tharp, 2005). مطالعات مختلفی در ایران و کشورهای متعدد در زمینه مقاومت و بررسی مکانیسم‌های آن در جو مقابل شته‌های مختلف غلات انجام گرفته است که از جمله آنها می‌توان به بررسی مقاومت در ۸ رقم جو و ۴ رقم گندم در برابر بیوتیپ G (Porter & Mornhinweg, 2004) شته معمولی گندم مطالعه مقاومت چهار رقم گندم در برابر بیوتیپ E شته معمولی گندم (Webster & Porter, 2000) و ارزیابی مقاومت ۲۰ رقم گندم در برابر شته معمولی گندم (Akhtar et al., 2006) اشاره کرد. همچنین، ارزیابی مقاومت در ارقام تجاری جو و گندم آمریکا در برابر شته گندم (Mordvilko) (Mornhinweg et al., 1995) و گندم روسی (Kindler & Springer, 1995) جو در برابر شته روسی گندم

در شهرستان ارومیه جمع‌آوری شدند. برای شناسایی Hein (2005) *et al* دقیق گونه شته از کلید شناسایی ارائه شده توسط یک جمعیت یکنواخت، تشکیل کلنی با یک شته بالغ بی‌بال شروع شد. پرورش شته‌ها در گلخانه‌ای با دمای 25 ± 2 درجه سلسیوس و رطوبت نسبی $10\pm 5.5\%$ و دوره نوری ۱۶ ساعت روشنایی و ۸ ساعت تاریکی انجام گرفت.

(جدول ۱) از مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی شهرستان ارومیه، و بذور ۱۳ رقم جو از گروه زراعت دانشکده کشاورزی دانشگاه ارومیه تهیه شدند. بذر هر یک از ژنوتیپ‌های جو در داخل‌گلدان‌ها پلاستیکی به قطر دهانه ۷ و ارتفاع ۱۰ سانتی‌متر کاشته شدند. خاک مورد استفاده مخلوطی از خاک مزرعه، ماسه و کود حیوانی به نسبت ۱:۱:۲ بود. شته‌های مذکور از مزارع جو

جدول ۱. شجره لاین‌های جو استفاده شده در آزمایش غربالگری

شماره لاین	شجره	شماره لاین	شجره
۱	Makouee/3/Roho/Mazurka//ICB-103020	۲۵	Pamir-010/Bulbul
۲	Michailo/K-096M3	۲۶	Productiv/3/Roho//Alger/Ceres362-1-1
۳	Michailo/Dobrinya	۲۷	Reaserch/Ashar//CWB117-5-9-5
۴	Antares/Ky63-1294//Marageh/4/Roho//Alger/Ceres362-1-1/3/CWB117-77-9-7	۲۸	Astrix(C)/3/Mal/OWB753328-5H'F1//Perga/Boyer/4/L.527
۵	ICB-100149/(L.B.IRAN/Una8271//Gloria'S'/Com'S'	۲۹	Robur/80-5151//CWB117-5-9-5
۶	Radikal/3/Walfajre/Scotia//Beecher.Sel	۳۰	Legia/3/LB.IRAN/UNA8271//GLORIA
۷	Janees/CWB117-5-9-5	۳۱	Pamir-013/Sonata
۸	K247/2401-13//Vavilon/3/Radical/Pervenets//Radical	۳۲	Check 2: (8th EBYTC86-14) Radical/Birgit//Pamir-154
۹	Robur/WA2196-68//K-281/Skorokhod	۳۳	Check 3: (8th EBYTC86-10) H177-02
۱۰	Mal1-4-3094-2//YEA422-1/YEA455-25	۳۴	Bugar/DZ48-232
۱۱	Alpha/Durra//SLB47-81	۳۵	Pamir-168
۱۲	Legia/3/Torsh/9cr.279-07/Bgs	۳۶	Batal-01*2/Batal-2
۱۳	Legia/CWB117-5-9-5	۳۷	Beecher SEL//Kroon/Kavir
۱۴	Plaisaut//MD45-286-13/OWB73173-2H-0H/3/...	۳۸	Torsh/Lgia
۱۵	Honahoh/Batal-01	۳۹	Dobrinya/Kozir
۱۶	Redut/OK84817	۴۰	Dobrinya/K-015
۱۷	Check 2: 7th EBYT-C 85-5 (Bereke-54)	۴۱	Oykor/Dobrinya
۱۸	Legia/4/ Kmk//Rbr/Wa2196-68/3/EBC(A)	۴۲	Michailo/Rostov
۱۹	Sonate/OWB813142//Sdwarf/3/L.527/MB2367	۴۳	Alpha/Durra//CWB117-77-9-7/4/Roho//Alger/Ceres362-1-1/3/Alpha/Durra
۲۰	Mal1-4-3094-2//Alpha/Cum/3/Victoria/... ICB01-1368-0AP	۴۴	Sls/Bda//Sararood-1
۲۱	Cyclon/3/Walfajre/EBC(a)//Beecher.Sel	۴۵	Makouee//Lokus/Robur
۲۲	Legia/Beecher	۴۶	Baluchistan/Cougar//Kozir
۲۳	Quina/Tropi	۴۷	Comp79ARD
۲۴	F2//Radical/Karat/3/Radical/4/Xemus		

اندکی تغییر انجام گرفت. از هر ژنوتیپ جو ۵ بذر در گلدان‌های مذکور کاشته و بعد از سبز شدن بذرها، یک گیاهچه در هر گلدان حفظ و بقیه گیاهچه‌ها حذف

آزمایش غربالگری
این آزمایش در قالب طرح کاملاً تصادفی با ۴ تکرار برای هر ژنوتیپ جو بر اساس روش (Miller, 1992) و با

گیاهان آلوده و غیرآلوده در انتهای آزمایش از سطح خاک اندازه‌گیری و یادداشت شد و درصد کاهش ارتفاع گیاهان آلوده نسبت به سالم نیز محاسبه گردید. تجزیه داده‌ها به وسیله نرمافزار SAS 9.1 انجام گرفت. برای مقایسه میانگین‌ها از روش آزمون توکی استفاده گردید. شایان ذکر است که فرضیات تجزیه واریانس از جمله نرمال بودن خطاهای بررسی و سپس آنالیزها انجام گرفتند.

نتایج و بحث

آزمایش غربالگری

شاخص در آزمایش غربالگری، تعداد شته‌های موجود روی هر گیاه در پایان ۱۴ روز آلودگی گیاهان با شتۀ معمولی گندم بود. نتایج تجزیه واریانس داده‌ها نشان داد که اختلاف معناداری در میان ژنوتیپ‌های آزمایش شده از نظر تعداد شتۀ موجود روی آنها وجود داشت ($P < 0.006$)، $F_{(59,180)} = 1.66$. مقایسه میانگین‌ها نشان داد که رقم زرجو با میانگین $334/25$ شتۀ دارای بیشترین و رقم ریحان با میانگین $116/50$ شتۀ دارای کمترین تعداد شتۀ بودند (جدول ۲). با توجه به شاخص ذکر شده در مرحلۀ غربالگری از میان ژنوتیپ‌های آزمایش شده، ارقام ریحان، نصرت و لاین ۲۰ با داشتن کمترین میانگین تعداد شتۀ به عنوان تیمارهای ظاهرًا مقاوم و دو لاین ۴۴ و ۱۳ و رقم زرجو با داشتن بیشترین میانگین تعداد شتۀ به عنوان تیمارهای ظاهرًا حساس از میان ژنوتیپ‌های آزمایش شده، برای بررسی دو مکانیسم آنتیزنوز و تحمل انتخاب شدند.

غربالگری ساده آزمایشگاهی در تفکیک ارقام مقاوم و حساس بسیار مفید و مؤثر بوده و ارزیابی مزرعه‌ای مقاومت عموماً منطبق بر نتایج غربال گلخانه‌ای است (Lowe, 1980). در پژوهش مشابهی، ۴۰ لاین جو *Rhopalosiphum padi* (L.) نسبت به شتۀ برگ یولاف (P.STO/3, QB813, SICH3.80) مقاوم (Nimene527) برای بررسی مکانیسم‌های مقاومت انتخاب شدند (Taghizadeh, 2011). در آزمایشی دیگر، سطح نسبی مقاومت در چهار ژنوتیپ جو

شدند. سپس در مرحلۀ دوبرگی، هر گیاه با سه شتۀ بالغ بی‌بال توسط قلم مو آلوده شده و بعد از ۱۴ روز تعداد شته‌های روی هر گیاه شمارش و یادداشت شدند و نهایتاً سه ژنوتیپ با کمترین میانگین و سه ژنوتیپ با بیشترین میانگین تعداد شتۀ برای بررسی مکانیسم‌های آنتیزنوز و تحمل انتخاب شدند. آزمایش‌های آنتیزنوز و تحمل در قالب طرح کاملاً تصادفی بر اساس روش (Webster, 1990) با اندکی تغییر به صورت زیر اجرا شدند.

آزمایش آنتیزنوز

بذر شش ژنوتیپ انتخاب شده در مرحلۀ غربالگری به طور تصادفی در ظروف دایره‌ای به قطر ۳۰ سانتی‌متر و عمق ۶ سانتی‌متر با فاصله‌های مساوی (۱۵ سانتی‌متر) کاشته شدند و هر ظرف با قفس‌های پلاستیکی شفاف که در انتهای دارای توری برای تهویه بود، محصور شد. بعد از یک‌برگی شدن گیاهان، ۴۰ شتۀ بالغ بی‌بال به طور همزمان در مرکز دایره رهاسازی و ۴۸، ۲۴ و ۷۲ ساعت بعد از رهاسازی، شته‌های مستقر شده روی هر گیاه شمارش شدند. این آزمایش در ۶ تکرار انجام گرفت.

آزمایش تحمل

بذر شش ژنوتیپ انتخاب شده در مرحلۀ غربالگری داخل گلدان‌های مذکور کاشته شد. بعد از این که بذرها سبز شدند، یک گیاهچه در هر گلدان حفظ و بقیه حذف شدند. چون شاخص تحمل در این آزمایش ارتفاع گیاه بود، در ابتدای آزمایش از همه ژنوتیپ‌ها، گیاهان با ارتفاع یکسان (۱۰ سانتی‌متر) انتخاب شدند.

آزمایش در ۸ تکرار (۴ تکرار آلوده و ۴ تکرار بدون آلودگی به عنوان شاهد) انجام گرفت. وقتی ارتفاع گیاهان (از سطح خاک) به حدود ۱۰ سانتی‌متر رسید، هر کدام از تکرارهای آلوده با ۱۰ شتۀ بالغ بی‌بال، آلوده و هر گیاه با پوشش پلاستیکی شفاف (دارای تهویه توری) به قطر ۶ و ارتفاع ۳۰ سانتی‌متر پوشیده شد. تکرارهای غیرآلوده به منظور جلوگیری از آلودگی با قفس‌های مذکور پوشانده شدند. هر ۴۸ ساعت یک بار نمونه‌ها بررسی شد و تعداد شته‌های هر گیاه با حذف پوره‌های زاییده شده در ۱۰ شتۀ بالغ تنظیم شد. مرگ شتۀ بالغ در طول آزمایش رخ نداد تا از کلونی جایگزین گردد. این آزمایش بعد از ۱۵ روز متوقف شد و ارتفاع

بیولاف (*Avena sativa* L.) (شاهد مقاوم) در برابر شتۀ روسی گندم بررسی شد. پس از غربالگری انبوه، ۱۷ رقم مقاوم و ۶ رقم حساس برای بررسی مکانیسم‌های مقاومت انتخاب شدند (Pourhaji, 1997).

(*Robinson et al.*, 1991). در پژوهش دیگری مقاومت ۷۶ رقم جو به همراه (S₁₆, S₁₃, S₁₂) در برابر شتۀ روسی گندم بررسی شد. پس از آزمون غربالگری ژنوتیپ‌های S₁₂ و S₁₃ به عنوان ژنوتیپ مقاوم و S₁₆ و S₁₇ به عنوان ژنوتیپ‌های حساس به شتۀ روسی انتخاب شدند. در پژوهش آنلودگی ۱۴ روز

جدول ۲. میانگین ± خطای معیار تعداد شتۀ معمولی گندم مستقر شده روی ژنوتیپ‌های جو در پایان ۱۴ روز آنلودگی*

لاین/رقم	میانگین تعداد شتۀ	لاین/رقم	میانگین تعداد شتۀ	لاین/رقم	میانگین تعداد شتۀ	لاین/رقم
۱۹۴/۵±۷/۳۷ ^{ab}	۱۹ لاین	۲۳۵/۵±۴۸/۱۹ ^{ab}	۱۶ لاین	۳۳۴/۲۵±۸۲/۸ ^a	زرجو	
۱۹۴/۲۵±۳۶/۵۸ ^{ab}	۲۳ لاین	۲۳۳±۱۳/۴۴ ^{ab}	۲۱ لاین	۳۰۱/۲۵±۴۶/۲۷ ^{ab}	۴۴ لاین	
۱۹۱/۵±۵۹/۴۷ ^{ab}	۳۱ لاین	۲۲۲/۲۵±۷۷/۱۸ ^{ab}	۳۸ لاین	۲۸۳/۵۰±۱۷/۸۲ ^{ab}	۱۳ لاین	
۱۹۱±۵۷/۷۵ ^{ab}	۴۳ لاین	۲۳۱/۵±۴۲/۳۸ ^{ab}	۲۲ لاین	۲۸۱/۱۵±۳۸/۱۹ ^{ab}	۱۴ لاین	
۱۹۰/۲۵±۶۶/۶۹ ^{ab}	۷ لاین	۲۳۱±۴۲/۳۷ ^{ab}	یوسف	۲۷۹/۵۰±۲۶/۴۵ ^{ab}	گرگان ۴	
۱۸۵/۵±۱۶/۹۲ ^{ab}	۱۰ لاین	۲۳۰/۵۰±۸۶/۶۱ ^{ab}	۲ لاین	۲۷۶/۷۵±۶۶/۱۸ ^{ab}	۴۷ لاین	
۱۸۵/۳۵±۷۳/۱۱ ^{ab}	۱۷ لاین	۲۲۴±۹۲/۱۴ ^{ab}	۱۵ لاین	۲۷۵/۵۰±۶۲/۸۰ ^{ab}	۴۶ لاین	
۱۸۵±۷۷/۸۱ ^{ab}	۱۸ لاین	۲۲۲/۲۵±۵۹/۰۸ ^{ab}	۱۱ لاین	۲۵۵/۴۰±۲۲/۱۹ ^{ab}	۲۵ لاین	
۱۸۲/۷۵±۸۰/۸۹ ^{ab}	۳۹ لاین	۲۱۸±۷۹/۱۳ ^{ab}	۲۵ لاین	۲۵۷±۹۵/۹۰ ^{ab}	ارس	
۱۸۲/۵۰±۱۴/۸۸ ^{ab}	بهمن	۲۱۶/۷۵±۱۰۲/۸ ^{ab}	دشت	۲۵۵/۵۰±۳۳/۴۹ ^{ab}	۹ لاین	
۱۷۶/۵۰±۳۳/۷۱ ^{ab}	۲۷ لاین	۲۱۵/۵۰±۲۶۰/۸ ^{ab}	۲۴ لاین	۲۵۴/۵۰±۵۰/۵۶ ^{ab}	۳۷ لاین	
۱۷۶/۲۵±۱۲۴/۴۲ ^{ab}	۳۳ لاین	۲۱۱/۲۵±۸۳/۸۴ ^{ab}	کویر	۲۵۳/۲۵±۴۹/۳۸ ^{ab}	۳۶ لاین	
۱۷۶/۲۵±۶۰/۶۹ ^{ab}	۱ لاین	۲۱۰/۲۵±۵۰/۹۸ ^{ab}	۴۵ لاین	۲۵۲/۷۵±۶۶/۲۷ ^{ab}	۶ لاین	
۱۷۴±۳۰/۲۴ ^{ab}	۳ لاین	۲۰۹±۱۲۴/۷۲ ^{ab}	۴۲ لاین	۲۵۲±۷۰/۶۸ ^{ab}	ترکمن	
۱۷۱/۷۵±۵۱/۵۰ ^{ab}	۸ لاین	۲۰۸/۷۵±۳۴/۶۲ ^{ab}	صحراء	۲۴۶/۲۵±۵۴/۹۹ ^{ab}	۴۱ لاین	
۱۶۷/۵۰±۸۰/۵۰ ^{ab}	۳۲ لاین	۲۰۷/۵۰±۴۷/۱۹ ^{ab}	۵ لاین	۲۴۵/۷۵±۹۰/۹۴ ^{ab}	۳۴ لاین	
۱۵۲/۷۵±۲۴/۴۵ ^{ab}	۳۰ لاین	۲۰۵/۵۰±۱۱۲/۱۸ ^{ab}	۲۸ لاین	۲۴۷/۲۳±۷۲/۰۵ ^{ab}	۱۲ لاین	
۱۵۰/۵۰±۵۹/۴۴ ^{ab}	۲۰ لاین	۲۰۳/۵۰±۹۹/۲۶ ^{ab}	والغجر	۲۴۴/۲۵±۷۲/۲۴ ^{ab}	۴ لاین	
۱۴۴/۲۵±۲۱/۰۹ ^{ab}	نصرت	۲۰۱±۳۵/۷۶ ^{ab}	جنوب	۲۴۲/۲۵±۸۱/۰۴ ^{ab}	۲۹ لاین	
۱۱۶/۵۰±۳۱/۲۲ ^b	ریحان	۱۹۵/۷۵±۱۲/۶۸ ^{ab}	۲۶ لاین	۲۳۹±۳۵/۵۶ ^{ab}	۴۰ لاین	

*حروف نام مشابه در هر ستون نشان‌دهنده تفاوت معنادار در سطح ۱ درصد است.

آزمایش آنتیزنوز، (F₅)_{۳۰}=۱۵/۷۸، (F₅)_{۳۹}=۳۹/۲۷، P<۰/۰۰۱، پس از رهاسازی شته‌ها و نیز در مجموع هر سه زمان (۰۰۰، ۰۱۰، ۰۲۰)، مؤید اختلاف معنادار میان ژنوتیپ‌های تحت مطالعه از نظر تعداد شتۀ جلب شده بود. بررسی میانگین‌ها نشان می‌دهد که پس از گذشت ۴۸ ساعت، جابه‌جایی شته‌ها در بین ژنوتیپ‌ها کاهش یافته است. همچنین بعد از ۷۲ ساعت تعداد شتۀ روی برخی از تیمارها کمتر از ۲۴ ساعت پس از رهاسازی بود، یعنی تعدادی از شته‌ها بعد از ۷۲ ساعت میزبان خود را ترک کردند (جدول ۳). مقایسه میانگین‌ها نشان داد که در هر سه زمان ۲۴، ۴۸ و ۷۲ ساعت پس از رهاسازی رقم زرجو بیشترین میانگین تعداد شتۀ جلب شده (۱۰/۳۳، ۱۰/۱۷، ۱۰/۲۶، P<۰/۰۰۱) و ۷۲ ساعت (۱۰/۳۰، P<۰/۰۰۱)

در آزمایش آنتیزنوز از آنجایی که ارتفاع همه گیاهان در ابتدای آزمایش به یک اندازه انتخاب شده بود و گیاهان در شرایط نوری یکسانی قرار داشتند، می‌توان گفت تأثیر ارتفاع و نور در جلب شته‌ها حذف شده و در نتیجه، علت اختلاف در تعداد شتۀ‌ها جلب شده به گیاهان تحت مطالعه، وجود یا نبود تفاوت‌های مورفو‌لوزیکی و بیوشیمیایی گیاهان تحت آزمایش مانند رنگ برگ، پرده‌های روی برگ، تراکم پرده، مواد مترشحه و غیره بوده است. نتایج تجزیه واریانس داده‌ها در هر سه مدت زمان ۲۴ ساعت (۱۰/۴۲، P<۰/۰۰۱)، ۴۸ ساعت (۱۰/۴۲، P<۰/۰۰۱)، ۷۲ ساعت (۱۰/۲۶، P<۰/۰۰۱) و ۷۲ ساعت (۱۰/۳۰، P<۰/۰۰۱)

(Webster *et al.*, 1987). همین‌طور، تأثیر آنتی‌بیوز در ارزیابی مقاومت پنج رقم جو (S16, S13, S8, S6, S4) در برابر شتۀ روسی گندم مشخص گردید که اختلاف معناداری از نظر مقاومت آنتی‌زنوز نسبت به این شته وجود داشت، به طوری که رقم S13 بیشترین و رقم S4 کمترین آنتی‌زنوز را داشتند (Robinson, 1992a). با این حال، در آزمایش مقاومت دو رقم جو Come/loria و Esperanza (Esperanza)، در برابر حمله شش گونه شتۀ غلات، از جمله شتۀ روسی گندم، رقم Esperanza توسط شتۀ روسی گندم بیشتر ترجیح داده شد، اما پنج گونه شتۀ دیگر هیچ‌کدام از این دو رقم را ترجیح ندادند. با وجود این، نتایج تحقیق حاضر معرف این نکته است که در مقاومت گیاه جو در برابر شتۀ معمولی گندم مکانیسم آنتی‌زنوز تأثیر دارد. احتمال می‌رود، جو نیز مانند دیگر غلات، ایندول پروتو آلکالوئید (Indol Proto Alkaloid)، را داشته باشد که یک ماده ضد تغذیه‌ای برای شته‌هاست (Robinson, 1992b).

(۱۰/۱۷) و رقم ریحان کمترین میانگین تعداد شتۀ جلب شده (۳/۱۷، ۳/۱۷، ۲/۸۳) را دارند. همچنین طبق مقایسه میانگین‌های مربوط به تجزیه هر سه زمان با هم نیز رقم ریحان با داشتن ۳/۰۵ شتۀ جلب شده و رقم زرجو با داشتن ۱۰/۲۲ شتۀ جلب شده به ترتیب کمترین و بیشترین مکانیسم آنتی‌زنوز (نبود ترجیح میزانی) را دارند (جدول ۳). پژوهش‌های مختلف نیز نقش مکانیسم آنتی‌زنوز را در مقاومت جو در برابر دیگر شته‌ها مؤثر دانسته‌اند. نتایج تحقیقات Pourhaji (1997) نشان داد که جو رقم ۷۴B۴-۴۸۱۵ با متوسط ۶/۵ شتۀ روی هر گیاه کمترین و جو رقم کویر با متوسط ۲/۷ شتۀ روی هر گیاه بیشترین آنتی‌زنوز را بروز دادند. پژوهش Taghizadeh (2011) نیز مانند نتایج تحقیق حاضر نشان داد که آنتی‌زنوز عامل مقاومت بعضی از ارقام و لاین‌های جو نسبت به شتۀ برگ یولاف است. مقاومت آنتی‌زنوز سه رقم جو همراه با ارقامی از گندم، یولاف و چادر به طور مشابهی نسبت به شتۀ روسی گندم بررسی شد که جو رقم Post ضعیفترین آنتی‌زنوز را داشت

جدول ۳. میانگین \pm خطای معیار تعداد شتۀ‌های معمولی گندم جلب شده به شش ژنوتیپ مختلف جو، ۲۴، ۴۸ و ۷۲ ساعت پس از رهاسازی و مجموع هر سه زمان*

لاین/رقم	تعداد شته بعد از ۲۴ ساعت	تعداد شته بعد از ۴۸ ساعت	تعداد شته بعد از ۷۲ ساعت	تعداد شته بعد از هر سه زمان
زرجو	۱۰/۳۳ \pm ۲/۳۳ ^a	۱۰/۱۷ \pm ۲/۰۴ ^a	۱۰/۱۷ \pm ۲/۰۴ ^a	۱۰/۲۲ \pm ۲/۱۵ ^a
نصرت	۷/۳۳ \pm ۲/۰۶ ^{ab}	۶/۸۳ \pm ۱/۷۲ ^b	۶/۸۳ \pm ۱/۷۲ ^b	۷/۱۶ \pm ۱/۸۰ ^b
لاین ۱۳	۶/۱۷ \pm ۱/۹۴ ^{bc}	۵/۸۳ \pm ۱/۴۷ ^{bc}	۵/۳۳ \pm ۱/۲۱ ^{bc}	۶/۱۱ \pm ۱/۵۹ ^{bc}
لاین ۴۴	۵/۸۳ \pm ۱/۴۷ ^{bc}	۵/۳۳ \pm ۱/۲۱ ^{bc}	۴/۵۰ \pm ۱/۳۷ ^{bc}	۵/۶۶ \pm ۱/۱۹ ^{bc}
لاین ۲۰	۴/۸۳ \pm ۱/۶۰ ^{bc}	۴/۵۰ \pm ۱/۳۷ ^{bc}	۴/۱۷ \pm ۱/۴۷ ^c	۴/۶۱ \pm ۱/۱۳ ^{dc}
ریحان	۳/۱۷ \pm ۱/۴۷ ^c	۲/۱۷ \pm ۱/۱۶ ^c	۱/۰۵ \pm ۱/۲۶ ^d	۳/۰۵ \pm ۱/۲۶ ^d

*حروف نامشابه در هر ستون نشان‌دهنده تفاوت معنادار در سطح ۱٪ است.

همانند صفت‌هایی از قبیل وزن هزار دانه، میزان عملکرد، مقاومت در برابر ورس، شوری و خشکی جزء مجموعه صفات مربوط به هر رقم یا لاین است (Inayatullah *et al.*, 1993; Tajbakhsh & Pourmirza, 2003). در گیاهان آلوده (بدون مقایسه با تیمارهای شاهدشان)، رقم ریحان بیشترین (۳۵/۴۰ cm) و لاین ۱۳ کمترین (۵/۰۵ cm) افزایش ارتفاع ثانویه را داشتند. البته ذکر این نکته ضروری است که برای بررسی سطح تحمل ژنوتیپ‌های آزمایش شده (با توجه به اینکه در ابتدای

آزمایش تحمل

نتایج تجزیه واریانس داده‌ها نشان داد که افزایش ارتفاع ثانویه هم در میان گیاهان آلوده ($P < 0.001$) و هم در میان گیاهان شاهد ($P < 0.001$)، ($F_{(5,18) = 16.77$) و هم در میان گیاهان شاهد ($F_{(5,18) = 10.11$) اختلاف معناداری با هم داشتند. مقایسه میانگین‌ها مؤید این نکته بود که در گیاهان شاهد رقم نصرت بیشترین (۴۲/۶۲ cm) و لاین ۱۳ کمترین (۳۱/۱۰ cm) افزایش ارتفاع ثانویه را داشتند. لازم به ذکر است که این تفاوت در ارتفاع گیاهان سالم

خود را تا حد تیمار شاهد افزایش دهد. نتایج تجزیه واریانس داده‌های مربوط به درصد کاهش ارتفاع گیاه آلوده نسبت به سالم نیز مطالب فوق را تأیید کرد و اختلاف معناداری را در میان ژنوتیپ‌های تحت آزمایش نشان داد ($P < 0.001$ ، $F_{(5,18)} = 29/80$). مقایسه میانگین‌های مشخص کرد که رقم ریحان با میانگین 20.9% کمترین و رقم زرجو با میانگین 9.6% بیشترین درصد کاهش ارتفاع را بروز دادند (ستون ۳ در جدول ۴). لذا با توجه به نتایج ذکر شده، می‌توان گفت که رقم ریحان از بالاترین و رقم زرجو از پایین‌ترین سطح تحمل در میان ژنوتیپ‌های تحت آزمایش برخوردار بوده‌اند. بنابراین، تحمل نیز مانند آنتیزنوز می‌تواند در مقاومت جو در برابر شتۀ معمولی گندم مؤثر باشد.

آزمایش گیاهان با ارتفاع یکسان انتخاب شدند، لازم بود افزایش ارتفاع ثانویه هر تیمار آلوده با شاهد مربوط (ستون ۱ و ۲ در جدول ۴) مقایسه شود.

نتایج این بررسی نشان داد که در میان ژنوتیپ‌های تحت آزمایش، رقم ریحان با دارا بودن بیشترین افزایش ارتفاع ثانویه در مقایسه با تیمار شاهدش (تیمار آلوده $35/40$ cm، تیمار شاهد $= 36/37$ cm) بالایی از تحمل را در برابر خسارت ناشی از تغذیه شتۀ معمولی گندم از خود نشان داده و توانسته است با جبران خسارت، ارتفاع خود را تا حد تیمار شاهد افزایش دهد. رقم زرجو با دارا بودن کمترین افزایش ارتفاع ثانویه در مقایسه با تیمار شاهدش (تیمار آلوده $= 28/85$ cm، تیمار شاهد $= 42/40$ cm) پایین‌ترین سطح تحمل را در برابر خسارت شته از خود بروز داد. لذا به خوبی قادر به جبران خسارت نبوده و به همین علت نتوانسته ارتفاع

جدول ۴. میانگین \pm خطای معیار ارتفاع ثانویه گیاه آلوده، افزایش ارتفاع ثانویه گیاه سالم (شاهد) و درصد کاهش ارتفاع گیاه آلوده نسبت به گیاه سالم (شاهد)

لاین/ رقم	گیاه آلوده	افزایش ارتفاع ثانویه	گیاه سالم	درصد کاهش ارتفاع گیاه آلوده نسبت به سالم
ریحان	$35/40 \pm 1/63^a$	$26/27 \pm 1/27^a$	$47/48 \pm 2/96^a$	$2/0.9 \pm 1/67^b$
نصرت	$17/18 \pm 9/48^b$	$28 \pm 3/98^{ab}$	$59/0.9 \pm 7/22^a$	$55/18 \pm 15/0.9^a$
لاین ۲۰	$9/8.5 \pm 4/97^b$	$34/12 \pm 3/34^{ab}$	$61/1.2 \pm 7/17^a$	$6/1.2 \pm 7/17^a$
لاین ۴۴	$7/17 \pm 4/66^b$	$31/1.0 \pm 1/54^b$	$63/57 \pm 7/64^a$	$65/96 \pm 8/55^a$
لاین ۱۳	$5/0.5 \pm 3/17^b$	$42/0.2 \pm 2/53^b$		
زرجو	$7/8.5 \pm 5/33^b$			

* حروف نامشابه در هر ستون نشان‌دهنده تفاوت معنادار در سطح 1% است.

ارزیابی تحمل پنج رقم جو (S16, S13, S8, S6, S4) نسبت به شتۀ روسی گندم با توجه به شاخص‌های ارتفاع و وزن اندام‌های هوایی و ریشه، در گلخانه مشخص کرد که ارتفاع و وزن ارقام S13 و S8 کمتر از سایر ارقام تحت تأثیر حملۀ شتۀ روسی گندم قرار گرفته بود و متتحمل‌ترین ارقام تشخیص داده شدند (Robinson, 1992 a). نتایج تحقیقات Boina *et al.* (2005) نشان داد که دو لاین گندم Sando's 4040 و KS89WGRC4 در برابر خسارت ناشی از تغذیه بیوتیپ I شتۀ معمولی گندم مقاوم هستند. ذکر این نکته نیز ضروری است که چون شتۀ معمولی گندم دارای بیوتیپ‌های متعددی در مناطق مختلف است، لذا واکنش ژنوتیپ‌های بررسی شده در این آزمایش نسبت به بیوتیپ‌های موجود در مناطق دیگر، ممکن است نتایج متفاوتی را در برداشته باشد. از آنجایی که مقاومت گیاهان به حشرات یک پدیده

بررسی‌های متعددی در زمینه تحمل ارقام جو در برابر شتۀ‌های غلات صورت گرفته است. نتایج تحقیقات انجام گرفته توسط Robinson *et al.* (1991) حاکی از آن بود که ژنوتیپ S13 از نظر ارتفاع گیاهان تحت تغذیه شته و وزن خشک برگ‌ها، در مقایسه با ژنوتیپ‌های دیگر ارتفاع و وزن خشک کمتری داشت. لذا این ژنوتیپ سطح تحمل پایین‌تری را در مقایسه با دیگر ژنوتیپ‌ها نشان داد. همین‌طور در پژوهشی تحمل شش لاین جو در مقایسه با شتۀ برگ یولاف ارزیابی شد که در میان لاین‌های بررسی شده، از نظر درصد کاهش ارتفاع و درصد رشد گیاه آلوده نسبت به سالم تفاوت معناداری وجود نداشت. این امر می‌تواند به این علت باشد که همه لاین‌های آزمایش شده از سطح تحمل یکسانی برخوردار بوده و توانایی آنها در جبران خسارت ناشی از شتۀ مذکور به یک اندازه بوده است (Taghizadeh, 2011).

گلخانه‌ای باعث می‌شود پژوهشگران علم اصلاح نباتات تحقیق و بررسی‌های بعدی را فقط روی چند ژنوتیپ انتخاب شده در مرحله غربالگری انجام دهند و از اجرای آزمایش‌های پرحجم، پرهزینه و زمانبر، بر روی تمام ژنوتیپ‌ها جلوگیری شود.

سپاسگزاری

بدین وسیله از جانب آقای دکتر عبداللهی استادیار گروه زراعت دانشکده کشاورزی ارومیه که بذرهای بعضی از ارقام جو را در اختیار ما قرار دادند تشکر و قدردانی می‌گردد.

نسبی است و بهشت تحت تأثیر شرایط محیطی قرار می‌گیرد، به منظور بررسی عکس العمل دقیق‌تر بهتر است مکانیسم‌ها بررسی شده در شرایط متغیر مزرعه نیز بررسی شوند.

نتیجه‌گیری کلی

نتایج این تحقیق نشان داد که دو مکانیسم آنتیزنوز و تحمل در مقاومت بعضی از ژنوتیپ‌های جو به شتۀ معمولی گندم مؤثر بوده‌اند. این نتایج برای انجام تحقیقات ژنتیکی و شناسایی ژن‌های مقاومت و در نتیجه، اصلاح ژنوتیپ‌های جو و توسعه مقاومت در آنها بسیار مناسب است. بهویژه، اجرای آزمایش غربالگری

REFERENCES

1. Akhtar, N., Ehsan-Ul-Haq, M. & Masood, A. (2006). Categories of resistance in national uniform wheat yield trials against *Schizaphis graminum* (Rondani) (Homoptera: Aphididae). *Pakistan Journal of Zoology*, 38(2), 167 - 171.
2. Blackman, R. L. & Eastop, V. F. (2000). *Aphids on the world's crops: an Identification and Information Guide*. UK: John Wiley & Sons publication, London. pp: 262 - 263.
3. Boina, D., Prabhakar, S., Smith, C. M., Starkey, S., Zhu, L., Boyko, E. & Reese, J. C. (2005). Categories of resistance to biotype I greenbugs (Homoptera: Aphididae) in wheat lines containing the greenbug resistance genes Gbx and Gby. *Journal of the Kansas Entomological Society*, 78(3), 252 - 260.
4. Burd, L. D. & Elliott, N. C., (1996). Changes in chlorophyll a fluorescence induction kinetics in cereals infested with Russian wheat aphid (Homoptera: Aphididae). *Journal of Economic Entomology*, 89, 1332 - 133.
5. Cheung, W. Y., Di Giorgio, L. & Ahman, I. (2010). Mapping resistance to the bird cherry-oat aphid (*Rhopalosiphum padi*) in barley. *Plant Breeding*, 129, 637 - 646.
6. Delp, G., Gradin, T., Ahman, I. & Jonsson, M. V. (2009). Microarray analysis of the interaction between the aphid *Rhopalosiphum padi* and host plants reveals both differences and similarities between susceptible and partially resistant barley lines. *Molecular Genetics and Genomics*, 281(3), 233 - 248.
7. Esmaili, M., Mirkarimi, A. A. & Azmayesh Fard, P. (2002). *Agricultural entomology*. Tehran University Publications, Tehran. 550 pp. (In Farsi).
8. Hein, G. L., Kalisch, J. A. & Thomas, J. (2005). *Cereal aphids*. Nebraska- Lincoln Extention University, from <http://www.ianrpubs.unl.edu/insects>.
9. Hesler, L. S. & Tharp, C. I. (2005). Antibiosis and antixenosis to *Rhopalosiphum padi* among triticale accessions. *Euphytica*, 143(1), 153 - 160.
10. Inayatullah, C., Ehsan-Ul-Haq, M. & Chaudhry, M. F. (1993). Incidence of greenbug, *Schizaphis graminum* (Rondani) (Homoptera: Aphididae) in Pakistan and resistance in wheat against it. *Insect Science and its Applications*, 14(2), 247 - 254.
11. Kindler, S. D. & Springer, T. L. (1992). Evaluation of resistance to Russian wheat aphid in *Hordeum bulbosum*. *Test of Agrochemicals and Cultivars*, 13, 40 - 91.
12. Lage, J., Skovmand, B. & Andersen, S. B. (2003). Characterization of greenbug (Homoptera: Aphididae) resistance in synthetic hexaploid wheats. *Journal of Economic Entomology*, 96(6), 1922 - 1928.
13. Lowe, H. J. B. (1980). Resistance to aphids in immature wheat and barley. *Annals of Applied Biology*, 95(1), 129 - 135.
14. Mashhadi-jafarloo, M. (2001). *Study on the antibiosis effects of common wheat cultivars in West Azarbayjan to Diuraphis noxia (Mordvilko) in field conditions*. M.Sc. dissertation. Tabriz University. (In Farsi).
15. Miller, R. (1992). Insect pests of wheat and barley of Mediterranean, Africa and West Asia. ICARDA, Aleppo, Syria, p19.

16. Mornhinweg, D. W., Porter, D. R. & Webster, J. A. (1995). Registration of STARS- 9301B barley germplasm resistant to Russian wheat aphid. *Crop Science*, 35, 602.
17. Murugan, M., Khan, S. A., Sotelo Cardona, P., Vargas Orozco, G., Viswanathan, P., Reese, J., Starkey, S. & Smith, C. M. (2010). Variation of resistance in barley against biotypes 1 and 2 of the Russian wheat aphid (Hemiptera: Aphididae). *Journal of Economic Entomology*, 103(3), 938 - 948.
18. Ng, J. C. K. & Perry, K. L. (2004). Transmission of plant viruses by aphid vectors. *Molecular Plant Pathology*, 5(5), 505 – 511.
19. Nour-Mohamadi, G., Siadat, A. & Kashani, A. (2008). *Agronomy Cereal Crops*. Shahid Chamram University Publications, Ahvaz. 446 pp. (In Farsi).
20. Nuessly, G. S. & Nagata, R. T. (2005 July). *Greenbug, Schizaphis graminum (Rondani) (Insecta: Hemiptera: Aphididae)*. Florida IFAS Extention University, from <http://www.creatures.ifas.ufl.edu>.
21. Panda, N. & Khush, G. S. (1995). Host plant resistance to insect. CAB International, Wallingford, Uk. 228p.
22. Porter, D. R. & Mornhinweg, D. W. (2004). New sources of resistance to greenbug in barley. *Crop Science*, 44, 1245 – 1247.
23. Pourhaji, A. (1997). *Detection of resistance in several wheat cultivars (Triticum spp.)*. M. Sc. dissertation. Shiraz University, Iran. (In Farsi).
24. Quick, J., Nkongolo, K., Meyer, W., Peairs, F. & Wearer, B. (1991). Russian wheat aphid reaction and agronomic and quality traits of resistant wheat. *Crop Science*, 31, 50 - 53.
25. Robinson, J. (1992a). Assessment of Russian wheat aphid (Hom: Aphididae) resistance in barley seedling in Mexico. *Journal of Economic Entomology*, 85(5), 1954 - 1962.
26. Robinson, J. (1992b). Modes of resistance in barley seedling to six aphids (Hom.: Aphididae) species. *Journal of Economic Entomology*, 85(6), 2510 - 2515.
27. Robinson, J., Enriquevivar, H., Alexander Burentt, P. & Stevencalhoun, D. (1991). Resistance to Russian wheat aphid (Homoptera: Aphididae) in barley genotypes. *Journal of Economic Entomology*, 84, 674 - 679.
28. Taghizadeh, S. (2011). Evaluation of various barley lines resistance against the Bird cherry-oat aphid *Rhopalosiphum padi* (L.) (Hemiptera: Aphididae). M.Sc. dissertation. Agricultural Faculty of Urmia University, Iran. (In Farsi).
29. Tajbakhsh, M. & Pourmirza, A. A. (2003). *Cereal Grain Crops*. Urmia Jihad Daneshgahi publications, Urmia. 312 pp. (In Farsi).
30. Tofangsazi, N., Kheradmand, K. Shahrokhi, S. & Talebi, A. A. (2011). Demography of greenbug, *Schizaphis graminum* (Rondani) (Hemiptera: Aphididae) on six barley cultivars. *Archives of Phytopathology and Plant Protection*, 44(5), 484 - 492.
31. Webster, J. A. (1990). Resistance in triticale to the Russian wheat aphid (Homoptera: Aphididae). *Journal of Economic Entomology*, 83(3), 1091 - 1095.
32. Webster, J. A. and Porter, D. R. 2000. Plant resistance components of two greenbug (Homoptera: Aphididae) resistant wheats. *Entomological Society of America*, 93(3), 1000-1004.
33. Webster, J. A., Starks, K. J. & Burton, R. L. (1987). Plant resistance studies with *Diuraphis noxia* (Hom.: Aphididae) a new United States wheat pest. *Journal of Economic Entomology*, 80, 944 - 949.